E11
.S10


Purchased by the
MARY STUART
BOOK FUND
Founded A.D. 1893
Cooper Union Library

* LISIMAQUE (*décurrente*) à grappes ſimples, terminales; diviſions de la corolle obtuſes; étamines plus longues que la corolle. *De l'iſle Tanna.*

Explication des fig.

Pl. 101. fig. 1. LISIMAQUE *vulgaire.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle ſéparée. (*c*) Calice. (*d*) Etamines. (*e*, *f*) Capſule entière. (*g*) La même coupée tranſverſalement. (*h*, *i*) La même ouverte. (*l*) Semence ſéparée & groſſie. (*m*) Sommité de la tige.

Pl. 101. fig. 2. LISIMAQUE *à quatre feuilles.* (*a*, *a*) Capſule entière. (*b*) La même coupée. (*c*) Valves ouvertes. (*d*) Récept. des ſemences mis à découvert. (*e*) Semences ſéparées. (*f*, *g*) Les mêmes coupées. (*h*) Partie ſupérieure de la tige.

285. MOURON.

Caract. eſſent.

COR. en roue, à 5 lobes. Capſ. 1-loculaire, s'ouvrant en travers.

Caract. nat.

Cal. partagé en cinq, pointu, perſiſtant: à découp. carinées.

Cor. monopétale, en roue. Tube nul. Limbe plane, partagé en cinq: à découp. ovales-arrondies, unies enſemble par leur baſe.

Etam. Cinq filamens, droits, plus courts que la corolle, velus inférieurement. Anth. preſqu'en cœur.

Piſt. Ovaire ſupérieur, globuleux. Style filiforme, léger, incliné. Stigmate en tête.

Péric. Capſule globuleuſe, uniloculaire, mucronée par le ſtyle, s'ouvrant tranſverſalement.

Sem. nombreuſes, ovales, trigones, ſcabres, attachés à un récept. globul. libre & alvéolé.

Tableau des eſpèces.

1983. MOURON *rouge.* Dict.
M. à feuilles ovales-pointues, plus courtes que les pédoncules; fleurs écarlates.
L. n. l'Europe, dans les champs. ⊙ *Tiges couchées.*

* LYSIMACHIA (*decurrens*) racemis ſimplicibus, terminalibus; corollæ ſegmentis obtuſis; ſtaminibus corolla longioribus. *Forſt. auſtr. n°. 65.*

Explicatio iconum.

Tab. 101. f. 1. LYSIMACHIA *vulgaris.* (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla ſeparata. (*c*) Calyx. (*d*) Stamina. (*e*, *f*) Capſula integra. (*g*) Eadem tranſverſim ſecta. (*h*, *i*) Eadem dehiſcens. (*l*) Semen ſeparatum & auctum. *Fig. ex Mill.* (*m*) Summitas caulis.

Tab. 101. fig. 2. LYSIMACHIA *quadrifolia.* (*a*, *a*) Capſula integra. (*b*) Eadem diſſecta. (*c*) Valvulæ dehiſcentes. (*d*) Recept. ſeminum denudatum. (*e*) Semina ſeparata. (*f*, *g*) Eadem diſſecta. *Fig. ex Gærtn.* (*h*) Pars ſup. caulis.

285. ANAGALLIS.

Charact. eſſent.

COR. rotata, 5-loba. Capſ. 1-locularis, circumſciſſa.

Charact. nat.

Cal. quinquepartitus, acutus, perſiſtens: laciniis carinatis.

Cor. monopetala, rotata. Tubus nullus. Limbus planus, quinquepartitus: laciniis ovato-ſubrotundis, baſi connexis.

Stam. Filamenta quinque, erecta, corolla breviora, infernè hirſuta. Antheræ ſubcordatæ.

Piſt. Germen ſuperum, globoſum. Stylus filiformis, læviter inclinatus. Stigma capitatum.

Peric. Capſula globoſa, unilocularis, ſtylo mucronata, circumſciſſa.

Sem. plurima, ovata, trigona, ſcabra, receptaculo globoſo, alveolato, liberoque affixa.

Conſpectus ſpecierum.

1983. ANAGALLIS *phœnicea.*
A. foliis ovato-acutis, pedunculo breviorib us; floribus coccineis.
Ex Europæ arvis. ⊙ *Caules procumbentes.*

1984. MOURON *bleu*. Dict.
M. à feuilles ovales-pointues, nerveuſes, de la longueur des péd.; fleurs bleues.
L. n. les lieux cult. de l'Europe. ⊙

1985. MOURON *à feuilles larges*.
M. à feuilles preſqu'en cœur, nerveuſes, amplexicaules; tige comprimée.
L. n. l'Eſpagne. ⊙ *Fl. bleues.*

1986. MOURON *à feuilles étroites*. Dict.
M. à feuilles linéaires-lancéolees, plus étroites à la baſe; tige droite.
L. n. l'Italie. ⊙ *Fl. bleues, grandes.*

1987. MOURON *feuilles de lin*. Dict.
M. à feuilles linéaires; tige droite.
L. n. le Portugal. ⊙

1988. MOURON *verticillé*. Dict.
M. à feuilles lancéolées: les caulinaires verticillées, réfléchies; tige droite.
L. n. l'Italie. ⊙ *Barrel. ic. 584.*

1989. MOURON *délicat*. Dict.
M. à feuilles ovales-arrondies, ſubacuminées, pétiolées; tige filiforme, rampante.
L. n. la France, aux lieux humides, &c. ♃

* MOURON (*nain*) à tige droite; feuilles arrondies, pointues, ſeſſiles. *De la Jamaique.*

Explication des fig.

Pl. 101. MOURON *rouge*. (*a*) Fleur entière groſſie. (*b*) Corolle vue par-deſſous. (*c*) La même vue en-deſſus. (*d*, *e*) Calice, piſtil. (*f*) Capſule ouverte. (*g*) Réceptacle des ſemences mis à découvert. (*h*) Semences ſéparées. (*i*, *l*) Les mêmes coupées diverſement.

286. SAMOLE.

Caract. eſſent.

COR. hypocratériforme, à 5 lobes. 5 écailles recouvrant les étamines. Capſ. 1-loculaire, ſemi-inférieure.

1984. ANAGALLIS *cærulea*.
A. foliis ovato-acutis, nervoſis, longitudine pedunculorum; floribus cæruleis.
Ex Europæ cultis. ⊙ *Caules erectiuſc.*

1985. ANAGALLIS *latifolia*.
A. foliis ſubcordatis, nervoſis, amplexicaulibus; caule compreſſo.
Ex Hiſpania. ⊙ *Præcedenti valdè affinis.*

1986. ANAGALLIS *monelli*.
A. foliis lineari-lanceolatis, baſi anguſtioribus; caule erecto.
Ex Italia. ⊙

1987. ANAGALLIS *linifolia*.
A. foliis linearibus; caule erecto.
Ex Luſitania. ⊙ *Fol. internodiis longiora.*

1988. ANAGALLIS *verticillata*.
A. foliis lanceolatis: caulinis verticillatis, reflexis: caule erecto.
Ex Italia. ⊙ *Allion. Fl. pedem. t. 85. f. 4.*

1989. ANAGALLIS *tenellà*.
A. foliis ovato-ſubrotundis, ſubacuminatis, petiolatis; caule filiformi, repente.
Ex Gallia, &c. in humidis. ♃

* ANAGALLIS (*pumila*) caule erecto; foliis ſubrotundis, acutis, ſeſſilibus. *Swartz. pr. 40.*

Explicatio iconum.

Tab. 101. ANAGALLIS *phœnicea*. (*a*) Flos integer auctus. (*b*) Corolla infra ſpectata. (*c*) Eadem deſuper conſpecta. (*d*, *e*) Calyx, piſtillum. *Fig. ex Mill.* (*f*) Capſula dehiſcens. (*g*) Recept. ſeminum denudatum. (*h*) Semina ſoluta. (*i*, *l*) Eadem diſſecta. *Fig. ex Gærtn.*

286. SAMOLUS.

Charact. eſſent.

COR. hypocrateriformis, 5-loba. Squamulæ 5. Stamina munientes. Capſ. 1-locularis, ſemi-infera.

Caract. nat.

Cal. partagé en cinq, demi-ſupérieur, obtus à la baſe : à découp. droites, perſiſtantes.

Cor. monopétale, hypocratériforme. Tube très-court, de la longueur du calice. Limbe plane, part. en cinq, obtus : écailles très-courtes, ſituées à la baſe des ſinus du limbe.

Etam. Cinq filamens, courts, recouverts par les écailles de la corolle. Anthères conniv. couvertes.

Piſt. Ovaire ſemi-inférieur. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigmate capité.

Péric. Capſule demi-inférieure, ovale, env. par le calice, uniloculaire, ſemi-quinquevalve.

Sem. nombreuſes, menues, anguleuſes, attachées à un placenta globuleux, libre & pédicellé.

Tableau des eſpèces.

1990. SAMOLE *aquatique*. Dict.
L. n. l'Europe, aux lieux aquatiques. ♂

Explication des fig.

Pl. 101. SAMOLE *aquatique*. (*a*) Fleur entière, groſſie. (*b*, *c*, *d*) Corolle, écailles, étamines (*e*, *f*) Calice, piſtil. (*g*) Capſule environnée par le calice. (*h*) Dents du calice coupées. (*i*) Capſule coupée tranſverſalement. (*l*) La même coupée dans ſa longueur, montrant le réceptacle des ſemences. (*m*) Semences ſéparées. (*n*, *o*) Semence coupée en travers & longitudinalement. (*p*) Partie ſupérieure de la tige.

287. PONGATI.

Caract. eſſent.

Cal. inférieur, 5-fide. Cor. 5-fide, plus petite que le calice. Capſ. compr. 2-locul. s'ouvrant en travers.

Caract. nat.

Cal. inférieur, urcéolé, quinquefide, perſiſtant : à découp. demi-ovales-conniventes.

Cor. monopétale, plus petite que le calice, quinquefide.

Charact. nat.

Cal. quinquepartitus, ſemi-ſuperus, baſi obtuſus : laciniis erectis, perſiſtentibus.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus breviſſimus, longitudine calycis. Limbus planus, quinquepartitus, obtuſus ; ſquamulæ breviſſimæ, ad baſin ſinus limbi.

Stam. Filamenta quinque, brevia, ſquamulis corollæ munita. Antheræ conniventes, tectæ.

Piſt. Germen ſemi-inferum. Stylus filiformis, longitudine ſtaminum. Stigma capitatum.

Peric. Capſula ſemi-infera, ovata, calyce cincta, unilocularis, ſemi-quinquevalvis.

Sem. plurima, exigua, angulata, receptaculo globoſo pedicellato liberoque affixa.

Conſpectus ſpecierum.

1990. SAMOLUS *valerandi*. T. 101.
Ex Europæ aquoſis. ♂

Explicatio iconum.

Tab. 101. SAMOLUS *valerandi*. (*a*) Flos integer auctus. (*b*, *c*, *d*) Corolla, ſquamæ, ſtamina. (*e*, *f*, Calyx, piſtillum. *Fig. ex Mill.* (*g*) Capſula calyce veſtita. (*h*) Calycis dentes reſecti. (*i*) Capſula tranſverſè ſciſſa, (*l*) Ejusdem ſectio longitudinalis, receptaculum ſeminum exhibens. (*m*) Semina ſeparata. (*n*, *o*) Semen tranſverſè & longitudinaliter ſectum. *Fig. ex Gærtn.* (*p*) Pars ſuperior caulis.

287. PONGATIUM.

Charact. eſſent.

Cal. inferus, 5-fidus. Cor. 5-fida, calyce minor. Capſ. compreſſa, 2-locularis, circumſciſſa.

Charact. nat.

Cal. inferus, urceolatus, quinquefidus, perſiſtens : laciniis ſemi-ovatis, conniventibus.

Cor. monopetala, calyce minor, quinquefida.

Etam. Cinq filamens très-courts, attachés à la baſe de la corolle. Anthères didymes, incluſes.
Piſt. Ovaire ſupérieur, orbiculé, comprimé. Style court. Stigmate en tête.
Péric. Capſule turbinée, comprimée, biloculaire, s'ouvrant tranſverſalement : à réceptacles des ſemences attachées à la cloiſon de chaque côté.
Sem. nombreuſes, très-petites, preſque cylindr.

Tableau des eſpèces.

1991. PONGATI *des Indes.* Dict.
L. n. l'Inde. ⊙ *Pl. glabre, à feuilles ſimples, alternes & à épis terminaux, verdâtres. Elle paroît avoir des rapports avec les plantains.*

288. DORÈNE.

Caract. eſſent.

Cal. 5-fide. Cor. 1-pétale, 5-fide. Stigm. échancré. Capſ. ſupérieure, 1-loculaire.

Caract. nat.

Cal. monophylle, quinquefide, plus court que la corolle, à découp. ovales, concaves.
Cor. monopétale, preſqu'en roue. Limbe quinquefide : à découp. ovales, obtuſes, droites.
Etam. Cinq filamens, très-courts, attachés au tube de la corolle. Anthères oblongues, ſubtétragones, incluſes.
Piſt. Ovaire ſupérieur, conique, glabre. Style de la long. de la corolle. Stigmate tronqué, échancré.
Péric. Capſule ovale, pointue, unilocculaire.
Sem. nombreuſes.

Tableau des eſpèces.

1992. DORÈNE *du Japon.* Dict. 2. p. 310.
L. n. le Japon. ♄ *Arbre à feuilles alternes.*

289. BACOPE.

Caract. eſſent.

Cal. partagé en cinq, irrégulier. Cor. en roue : à tube ſtaminifère. Capſ. 1-loculaire, polyſp.

Stam. Filamenta quinque, breviſſima, baſi corollæ inſerta. Antheræ didymæ, incluſæ.
Piſt. Germen ſuperum, orbiculatum, depreſſum. Stylus brevis. Stigma capitatum.
Peric. Capſula turbinata, compreſſa, circumſciſſa, bilocularis : receptaculis ſeminiferis, diſſepimento utrinque affixis.

Sem. numeroſa, minutiſſima, ſubteretia.

Conſpectus ſpecierum.

1991. PONGATIUM *Indicum.*
Ex India. ⊙ *Sonnerat. Pongatium. Juſſ. gen. 423. Sphenoclea. Gærtn. t. 24. Gærtn. pongati. Retz. obſ. faſc. 6. n°. 27. Pongati. Rheed. mal. XI. t. 24.*

288. DORÆNA.

Charact. eſſent.

Cal. 5-fidus. Cor. 1-petala, 5-fida. Stigma emarginatum. Capſ. ſupera, 1-locularis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquefidus, corolla brevior : laciniis ovatis, concavis.
Cor. monopetala, ſubrotata. Limbus quinquefidus : laciniis ovatis, obtuſis, erectis.
Stam. Filamenta quinque, breviſſima, tubo corollæ, inſerta. Antheræ oblongæ, ſubtetragonæ, incluſæ.
Piſt. Germen ſuperum, conicum, glabrum. Stylus longitudine corollæ. Stigma truncatum, emarginatum.
Peric. Capſula ovata, acuta, unilocularis.
Sem. plurima.

Conſpectus ſpecierum.

1992. DORÆNA *Japonica.*
E Japonia. ♄ *Arbor, f. alternis.*

289. BACOPA.

Charact. eſſent.

Cal. 5-partitus, inæqualis. Cor. rotata : tubo ſtaminifero. Capſ. 1-locularis, polyſperma.

Caract. nat.

Cal. monophylle, partagé en cinq, irrégulier : à deux découp. oppoſées, oblongues, concaves, pointues ; deux inférieures ovales, pointues, réfléchies ; une ſup. plus large, arrondie, ondulée.

Cor. monopétale, en roue. Tube court, dilaté vers l'orifice. Limbe partagé en cinq découp. ovales-oblongues, obtuſes, égales, ouvertes.

Etam. Cinq filamens, attachés au tube de la corolle. Anthères ſagittées.

Piſt. Ovaire demi-ſupérieur, ovale, un peu comprimé. Style court. Stigmate en tête.

Péric. Capſule membraneuſe, adnée au calice inférieurement, uniloculaire.

Sem. nombreuſes, très-petites.

Tableau des eſpèces.

1993. BACOPE *aquatique*. Dict. 1. p. 348. *L. n.* l'iſle de Cayenne. *Herbe à f. oppoſées.*

Explication des fig.

Pl. 102. BACOPE *aquatique*. (*a*) Fleur entière, demi-ouverte ; pédonc. à deux bractées. (*b*) Fleur ouverte. (*c*) Corolle ouverte, étamines. (*d*) Calice, piſtil. (*e*) Corolle vue en-deſſous. (*f*) Etamine. (*g*) Piſtil. (*h*) Partie de la tige.

290. BASSOVE.

Caract. eſſent.

CAL. 5-fide. Cor. en roue. Baie ovale, noduleuſe : à ſem. bordées d'une membrane.

Caract. nat.

Cal. monophylle, perſiſtant, partagé en cinq découpures ovales, pointues.

Cor. monopétale, en roue. Tube très-court. Limbe quinquefide, ouvert : à découp. ovales, pointues, plus grandes que le calice.

Etam. Cinq filamens, courts, attachés au tube de la corolle, & oppoſés à ſes diviſions. Anth. ovales.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquepartitus, inæqualis : laciniis duabus oppoſitis, oblongis, concavis, acutis ; duabus inferioribus, ovatis, acutis, deflexis ; unica ſuperiore latiore, ſubrotunda, undulata.

Cor. monopetala, rotata. Tubus brevis, verſus orificium dilatatus. Limbus quinquepartitus : laciniis ov.-obl. obtuſis, æqualibus patentibus.

Stam. Filamenta quinque, tubo corollæ inſerta. Antheræ ſagittatæ.

Piſt. Germen ſemi-ſuperum, ovatum, ſubcompreſſum. Stylus brevis. Stigma capitatum.

Peric. Capſula membranacea, infernè calyci adnata, unilocularis.

Sem. plurima, minutiſſima.

Conſpectus ſpecierum.

1993. BACOPA *aquatica*. T. 102. E Cayenna. *Aubl. Guian. 128. t. 49.*

Explicatio iconum.

Tab. 102. BACOPA *aquatica*. (*a*) Flos integer ; dehiſcens ; pedunculo bibracteato. (*b*) Flos expanſus. (*c*) Corolla aperta, ſtamina. (*d*) Calyx, piſtillum. (*e*) Corolla infernè viſa. (*f*) Stamen. (*g*) Piſtillum. (*h*) Pars caulis. *Fig. ex Aubl.*

290. BASSOVIA.

Charact. eſſent.

CAL. 5-fidus. Cor. rotata. Bacca ovata, noduloſa : ſeminibus membrana marginatis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, perſiſtens, quinquepartitus ; laciniis ovatis, acutis.

Cor. monopetala, rotata. Tubus breviſſimus. Limbus quinquefidus, patens : laciniis ovatis, acutis, calyce majoribus.

Stam. Filamenta quinque, tubo corollæ inſerta, ejuſque laciniis oppoſita, brevia. Antheræ ovatæ.

Pist. Ovaire supérieur, ovale, posé sur un disque. Style court. Stigmate un peu épais, obtus.

Péric. Baie ovale, noduleuse.

Sem. nombreuses, fort petites, réniformes, bordées d'une petite membrane, enfoncées dans une pulpe.

Tableau des espèces.

1994. BASSOVE *des forêts*. Dict. 1. p. 388. *L. n.* les forêts de la Guiane.

Explication des fig.

Pl. 102. BASSOVE *des forêts*. (*a*) Fleur ouverte. (*b*) Corolle séparée, vue en dessous. (*c*) Calice. (*d*) Etamines. (*e*) Baie. (*f*) Semence grossie, avec sa membrane.

291. DIAPENZE.

Caract. essent.

CAL. 5-phylle, embriqué ext. par 3 folioles. Cor. hypocratériforme. Capf. à 3 loges.

Caract. nat.

Cal. octophylle, dont cinq folioles intérieures, situées orbiculairement; les trois autres serrées & embriquées contre les premières: toutes ces fol. égales, ovales, obtuses, droites, persistantes.

Cor. monopétale, hypocratériforme. Tube cylindracé, ouvert, de la longueur du calice. Limbe quinquefide, obtus, plane.

Etam. Cinq filamens, linéaires, applatis, courts, droits, attachés au sommet du tube, entre les divisions du limbe. Anthères simples.

Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style de la longueur des étamines. Stigmate obtus.

Péric. Capsule arrondie, triloculaire, trivalve.

Sem. nombreuses, arrondies.

Tableau des espèces.

1995. DIAPENZE *de Lapponie*. Dict. 2. p. 276. *L. n.* les montagnes de la Lapponie. ♄

Pist. Germen superum, ovatum, disco insidens. Stylus brevis. Stigma crassiusculum, obtusum.

Peric. Bacca ovata, noduloſa.

Sem. plurima, minuta; reniformia, membranula cincta, in pulpa nidulantia.

Conspectus specierum.

1994. BASSOVIA *sylvatica*. T. 102. Ex sylvis Guianæ. *Aubl. Guian. t. 85.*

Explicatio iconum.

Tab. 102. BASSOVIA *sylvatica*. (*a*) Flos apertus. (*b*) Corolla separata, inferne visa. (*c*) Calyx. (*d*) Stamina. (*e*) Bacca. (*f*) Semen ampliatum, cum membrana. *Fig. ex Aubl.*

291. DIAPENSIA.

Charact. essent.

CAL. 5-phyllus, extùs imbricatus foliolis 3. Cor. hypocrateriformis. Capf 3-locularis.

Charact. nat.

Cal. octophyllus: foliolis quinque interioribus, in orbem positis; reliquis tribus imbricatim incumbentibus; omnibus æqualibus, ovatis, erectis, persistentibus.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindraceus, apertus, longitudine calycis. Limbus quinquefidus, obtusus, planus.

Stam. Filamenta quinque, linearia, compressa, brevia, erecta, summo tubo inserta, ad incisuras limbi. Antheræ simplices.

Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus longitudine staminum. Stigma obtusum.

Peric. Capf. subrotunda, trilocularis, trivalvis.

Sem. plurima, subrotunda.

Conspectus specierum.

1995. DIAPENSIA *Lapponica*. T. 102. Ex alpibus Lapponicis. ♄ *Fl. dan. t. 47.*

292. CORIS.

Caract. eſſent.

Cal. ventru : à dents preſqu'épineuſes. Cor. 1-pétale, irrégulière. Capſ. à 5 valves, enfermées dans le calice.

Caract. nat.

Cal. monophylle, ventru, perſiſtant, à cinq dents au ſommet, couronné ext. par cinq pointes, preſqu'épineuſes.

Cor. monopétale, irrégulière. Tube cylindracé, de la longueur du calice. Limbe plane, partagé en cinq découp. oblongues, obtuſes, échancrées, inégales.

Etam. Cinq filamens ſétacés, inclinés, un peu plus courts que la corolle. Anth. arrondies.

Piſt. Ovaire ſupérieur, arrondi. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigmate ſimple.

Péric. Capſule globuleuſe, ſituée au fond du calice, uniloculaire, à 5 valves.

Sem. nombreuſes, ovoïdes, petites.

Tableau des eſpèces.

1996. CORIS *de Montpellier.* Dict. 2. p. 110. *L. n.* les lieux ſabl. & marit. de l'Eur. auſtr. ⊙

Explication des fig.

Pl. 102. Coris *de Montpellier.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle ſéparée. (*c*) Calice. (*d*) Le même ouvert. (*e*) Piſtil. (*f*) Capſule entière. (*g*) La même ouverte. (*h*) Semences.

293. MOUROUCOU.

Caract. eſſent.

Cal. 5-fide, connivent. Cor. hypocratériforme. Stigm. à 2 lames. Capſ. à 2 ou 3 loges, 1-ſpermes.

Caract. nat.

Cal. monophylle, turbiné, coloré, perſiſtant, quinquefide; à découp. arrondies.

292. CORIS.

Charact. eſſent.

Cal. ventricoſus : dentibus ſubſpinoſis. Cor. 1-petala, irregularis. Capſ. 5-valvis, calyce incluſa.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, ventricoſus, perſiſtens, apice quinquedentatus, extùs coronatus ſetis quinis ſubſpinoſis.

Cor. monopetala, irregularis. Tubus longitudine calycis, cylindraceus. Limbus planus, quinquepartitus : laciniis oblongis, obtuſis, emarginatis, inæqualibus.

Stam. Filamenta quinque, ſetacea, declinata, corolla ſubbreviora. Antheræ ſubrotundæ.

Piſt. Germen ſuperum, ſubrotundum. Stylus filif. longitudine ſtaminum. Stigma ſimplex.

Peric. Capſula globoſa, in fundo calycis poſita, unilocularis, quinquevalvis.

Sem. plurima, ſubovata, parva.

Conſpectus ſpecierum.

1996. CORIS *Monſpelienſis.* T. 102. Ex Europæ auſtr. arenoſis marit. ⊙

Explicatio iconum.

Tab. 102. Coris *Monſpelienſis.* (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla ſeparata. (*c*) Calyx. (*d*) Idem apertus. (*e*) Piſtillum. (*f*) Capſula integra. (*g*) Eadem dehiſcens. (*h*) Semina. *Fig. ex Tourneſ.*

293. MURUCOA.

Charact. eſſent.

Cal. 5-fidus, connivens. Cor. hypocrateriformis. Stigma 2-lamellatum. Capſ. 2 ſ. 3-locularis : loculis 1-ſpermis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, turbinatus, coloratus, perſiſtens, quinquefidus : laciniis ſubrotundis.

Cor. monopétale, hypocratériforme. Tube court. Limbe quinquefide : à lobes amples arrondis, ouverts.

Etam. Cinq filamens, attachés à l'orifice du tube, opposés aux lobes. Anthères oblongues, couchées.

Pist. Ovaire supérieur, conique. Style long. Stigmate à deux lames.

Peric. Capsule ovale, pointue, coriace, fibreuse, couverte à sa base par le calice, à 2 ou 3 loges.

Sem. solitaires, oblongues, planes en leur face interne, convexes sur le dos.

Tableau des espèces.

1997. MOUROUCOU *violet.* Dict.
L. n. les forêts de la Guiane. ♄

Explication des fig.

Pl. 103. MOUROUCOU *violet.* (*a*) Calice. (*b*) Corolle, étamines, Style. (*c*) Capsule. (*d*, *e*) Semences.

294. RETZIE.

Caract. essent.

COR. cylindrique, velue en-dehors : à limbe court. Stigm. 2-fide. Capsule à 2 loges.

Caract. nat.

Cal. monophylle, quinquefide : à découp. lancéolées, droites, inégales.

Cor. monopétale, tubuleuse, cylindrique, velue en-dehors. Limbe court, quinquefide : à découpures ovales, obtuses, concaves, droites, très-velues au sommet.

Etam. Cinq filamens, très-courts, attachés au sommet du tube. Anthères presqu'en cœur.

Pist. Ovaire supérieur, petit, conique. Style filiforme, plus long que la cor. Stigmate bifide.

Péric. Capsule oblongue, pointue, à 2 sillons, deux loges, deux valves.

Sem. plusieurs, très-petites.

Tableau des espèces.

1998. RETZIE *du Cap.* Dict.
L. n. les mont. du Cap de B. Espérance. ♄

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus brevis. Limbus quinquefidus : lobis amplis, subrotundis, patentibus.

Stam. Filamenta quinque, fauci tubi inserta, lobis opposita. Antheræ oblongæ, incumbentes.

Pist. Germen superum, conicum. Stylus longus. Stigma bilamellatum.

Peric. Capsula ovata, acuta, coriacea, fibrosa, basi calyce tecta, bi vel trilocularis.

Sem. solitaria, oblonga, intùs plana, extùs convexa.

Conspectus specierum.

1997. MURUCOA *violacea.* T. 103.
Ex sylvis Guianæ. ♄ *Aubl. t. 54.*

Explicatio iconum.

Tab. 103. MURUCOA *violacea.* (*a*) Calyx. (*b*) Corolla, stamina, stylus. (*c*) Capsula. (*d*, *e*) Semina. *Fig. ex Aubl.*

294. RETZIA.

Charact. essent.

COR. cylindrica, extus villosa : limbo brevi. Stigma bifidum. Capsul. 2-locularis.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquefidus : laciniis lanceolatis, erectis, inæqualibus.

Cor. monopetala, tubulosa, cylindrica, extus villosa. Limbus brevis, quinquefidus : laciniis ovatis, obtusis, concavis, erectis, apice hirsutissimis.

Stam. Filamenta quinque, breviſſima, apici tubi inserta. Antheræ subcordatæ.

Pist. Germen superum, parvum, conicum. Stylus filiformis, corolla longior. Stigma bifidum.

Peric. Capsula oblonga, acuta, bisulcata, bilocularis, bivalvis.

Sem. plura, minuta.

Conspectus specierum.

1998. RETZIA *Capensis.* T. 103.
E Capitis Bonæ Spei montibus. ♄

Explication

Explication des fig.

Pl. 103. RETZIE *du Cap.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle ouverte. (*c*) Calice ouvert, pistil. (*d*) Etam. (*e*) Pistil. (*f*) Rameau fleuri.

295. ENDRACH.

Caract. essent.

CAL. persistant. Cor. urcéolée, velue en-dehors. Etam. saillantes. Capf. ligneuse, subsistipitée, 2-loculaire.

Caract. nat.

Cal. pentaphylle, coriace, persistant : à folioles arrondies, deux plus extérieures.
Cor. monopétale, urcéolée, presque campanulée, plissée, velue en-dehors, légèrement à cinq lobes : à lobes courts, obtus, droits.
Etam. Cinq filamens, subulés, une fois plus longs que la corolle, attachés à sa base, un peu arqués. Anthères en cœur-oblongues.
Pist. Ovaire supérieur, arrondi, velu. Style filiforme, de la longueur des étamines, courbé. Stigmate obtus.
Péric. Capsule ovale-globuleuse, ligneuse, un peu pédiculée, ombiliquée à sa base, biloculaire.
Sem. geminées, ovales-trigones, concaves à la base.

Tableau des espèces.

1999. ENDRACH *de Madagasc.* Dict. 2. 356. *L. n.* Madag. ♄ *Arbre. Feuilles éparses, ramassées aux extrémités des rameaux. Péd. axill. uniflores.*

Explication des fig.

Pl. 103. ENDRACH *de Madagascar.* (*A*) Fleur entière. (*a*) Corolle ouverte, étamines. (*b*) Calice, pistil. (*c*) Pistil séparé. (*d*) Capsule. (*e*) La même vue en-dessous. (*f*) Calice, pédicule de la capsule.

296. LISERON.

Caract. essent.

CAL. partagé en cinq. Cor. campanulée, plissée. 2 stigmates. Capf. 2-loculaire : à loges subdispermes.

Explicatio iconum.

Tab. 103. RETZIA *Capensis.* (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla aperta. (*c*) Calyx apertus, pistillum. (*d*) Stamina. (*e*) Pistillum. (*f*) Ramus florifer.

295. HUMBERTIA.

Charact. essent.

CAL. persistens. Cor. urceolata, extùs hirsuta. Stam. exserta. Capf. lignosa, subsistipitata, 2-locularis.

Charact. nat.

Cal. pentaphyllus, coriaceus, persistens : foliolis subrotundis ; duobus exterioribus.
Cor. monopetala, urceolata, subcampanulata, plicata, extùs hirsuta, obsoletè quinqueloba : lobis brevibus, obtusis, erectis.
Stam. Filamenta quinque, subulata, corolla duplo longiora, imæ corollæ affixa, subarcuata. Antheræ cordato-oblongæ.
Pist. Germen superum, subrotundum, hirsutum. Stylus filiformis, longitudine staminum, incurvum. Stigma obtusum.
Peric. Capsula ovato-globosa, lignosa, subsistipitata, basi umbilicata, bilocularis.

Sem. bina, ovato-trigona, basi concava.

Conspectus specierum.

1999. HUMBERTIA *Madagascarienſis.* T. 103. Ex Madagascaria. ♄ *Thouinia spectabilis. Smith. ic. t. 7. Endrachium Juss. gen. 133. Smithia. Gmel. Syst. nat. 2. p. 388.*

Explicatio iconum.

Tab. 103. HUMBERTIA *Madagascarienſis.* (*A*) Flos integer. (*a*) Corolla aperta, stamina. (*b*) Calyx, pistillum. (*c*) Pistillum separatum. (*d*) Capsula. (*e*) Eadem infra spectata. (*f*) Calyx, stipes capsulæ.

296. CONVOLVULUS.

Charact. essent.

CAL. 5-partitus. Cor. campanulata, plicata. Stigmata 2. Capf. 2-locularis : loculis subdispermis.

Caract. nat.

Cal. partagé en cinq, connivent, perſiſtant : à découp. ovales-oblongues.

Cor. monopétale, campanulée, (quelquefois infundibuliforme), pliſſée, à limbe ouvert, obtus, obſcurément à cinq lobes.

Etam. Cinq filamens ſubulés, plus courts que la corolle, rapprochés à la baſe. Anthères ovales, comprimées.

Piſt. Ovaire ſupérieur, arrondi. Style filiforme. Deux ſtigmates oblongs.

Péric. Capſule entourée par le calice, arrondie, biloculaire.

Sem. geminées, arrondies.

Tableau des eſpèces.

* *Pédoncules uniflores.*

2000. LISERON *des haies.* Dict. n°. 1.
L. à feuilles ſagittées, tronquées poſtérieurement; péd. tétragones, bractées en cœur, plus grandes que le calice.
L. n. l'Europe, dans les haies. ♃

2001. LISERON *des champs.* Dict. n°. 2.
L. à feuilles ſagittées, pointues poſtérieurement; bractées ſubulées, éloignées du calice.
L. n. l'Europe, dans les champs. ♃

2002. LISERON *auriculé.* Dict. n°. 3.
L. à feuilles linéaires, haſtées, acuminées, à oreillettes entières; tige volubile.
L. n. l'Europe auſtrale, l'Aſie, &c. *Var. de la précédente ?*

2003. LISERON *de Sicile.* Dict. n°. 4.
L. à feuilles en cœur-ovales, bractées lancéolées; pédonc. plus longs que les pétioles.
L. n. la Sicile. ⊙ *Fl. bleues, petites.*

2004. LISERON *denticulé.* Dict. n°. 5.
L. à feuilles en cœur, liſſes : à oreillettes munies en-dehors d'une petite dent; péd. uniflores; calice court.
L. n. les iſles Séchelles. *Commerſ. herb.*

Charact. nat.

Cal. quinquepartitus, connivens, perſiſtens; laciniis ovato-oblongis.

Cor. monopetala, campanulata (interdum infundibuliformis), plicata; limbo patente, obtuſo, obſoletè quinquelobo.

Stam. Filamenta quinque, ſubulata, corolla breviora, baſi approximata. Antheræ ovatæ, compreſſæ.

Piſt. Germen ſuperum, ſubrotundum. Stylus filiformis. Stigmata duo, oblonga.

Peric. Capſula calyce obvoluta, ſubrotunda, bilocularis.

Sem. bina, ſubrotunda.

Conſpectus ſpecierum.

* *Pedunculi uniflori.*

2000. CONVOLVULUS *ſepium.* T. 104. f. 1.
C. foliis ſagittatis, poſticè truncatis; pedunculis tetragonis; bracteis cordatis, calyce majoribus.
Ex Europæ ſepibus. ♃ *Flores albi.*

2001. CONVOLVULUS *arvenſis.*
C. foliis ſagittatis, poſticè acutis; bracteis ſubulatis à calyce remotis.
Ex Europæ agris. ♃ *Fl. ſæpè roſei ſ. purpurei.*

2002. CONVOLVULUS *auriculatus.*
C. foliis linearibus, haſtato-acuminatis, auriculis integris; caule volubili.
Ex Europa auſtrali, Aſia, &c. *Pluk. t. 24. f. 3.*

2003. CONVOLVULUS *Siculus.*
C. foliis cordato-ovatis, bracteis lanceolatis; pedunculis petiolo longioribus.
Ex Sicilia. ⊙ *Fl. cærulei, parvi.*

2004. CONVOLVULUS *denticulatus.*
C. foliis cordatis, lævibus; auriculis denticulo extrorſum notatis; pedunculis uniflo-ris; calyce brevi.
Ex inſ. Indiæ Sechelles dictis.

2005. LISERON *du Japon.* Dict. n°. 6.
L. à feuilles haſtées, lancéolées : à lobes lat. munis d'une dent; péd. uniflores; tige volubile.
L. n. le Japon. *Pédonc. plus courtes que les f.*

2006. LISERON *ſans bractées.* Dict. n°. 7.
L. à feuilles en cœur, ſagittées, obtuſes poſtérieurement; péd ſans bractées, plus courtes que les pétioles.
L. n. . . . . Fl. blanches, petites.

2007. LISERON *à fl. blanches.* Dict. n°. 8.
L. à feuilles en cœur, acuminées; pédonc. munis de bractées, plus courts que les pétioles.
L. n. les pays chauds de l'Amérique. ⊙ *Je doute qu'il ſoit ſuff. diſt. du précédent.*

2008. LISERON *fruticuleux.* Dict. n°. 9.
L. à feuilles linéaires-lancéolées, un peu en cœur à la baſe, à pétioles courts; f. denſes ſur les ram. fleuris.
L. n. les Canaries. ♄ *Collignon.*

2009. LISERON *ſagitté.* Dict. n°. 10.
L. à feuilles linéaires, haſtées, acuminées; calices ſagittés.
L. n. l'iſle de Madagaſcar. *Pl. glabre.*

2010. LISERON *haſté.* Dict. n°. 11.
L. à feuilles linéaires, haſtées, acuminées; oreillettes dentées; folioles calicinales ſimples
L. n. l'Inde. *Sonnerat.*

2011. LISERON *à trois dents.* Dict. n°. 12.
L. à feuilles cuneiformes à 3 pointes; baſe élargie, dentée; pédoncules uniflores.
L. n. les Indes orientales. ⊙

2012. LISERON *jalap.* Dict. n°. 13.
L. à feuilles difformes : les inf. preſqu'en cœur, triangulaires; les ſup. ovales-lancéolées; tige volubile.
L. n. le Mexique. ♆ *Le Jalap des boutiques.*

2013. LISERON *à grandes fleurs.* Dict. n°. 14.
L. à feuilles en cœur, pointues, à longs pétioles; pédonc. courts, uniflores; corolle grande, infundibuliforme.
L. n. la Martinique. ♆ *Fl. blanche.*

2005. CONVOLVULUS *Japonicus.*
C. foliis haſtatis, lanceolatis; lobis lateralibus unidentatis; pedunculis unifloris; caule volubili.
Ex Japonia. *Thunb. fl. Jap. 85.*

2006. CONVOLVULUS *ebracteatus.*
C. foliis cordato-ſagittatis, poſticè obtuſis; pedunculis petiolo brevioribus, ebracteatis.
Ex . . . . *In horto paris. cult.*

2007. CONVOLVULUS *leucanthus.*
C. foliis cordatis, acuminatis; pedunculis bracteatis, petiolo brevioribus.
Ex America calidiore. ⊙ *Ipomœa leucantha. Jacq. collect. 2. & ic. rar.*

2008. CONVOLVULUS *fruticuloſus.*
C. foliis lineari-lanceolatis, baſi ſubcordatis, petiolis brevibus; ramis floriferis confertè folioſis.
E Canariis. ♄ *Caules volub. Fol. anguſta.*

2009. CONVOLVULUS *medium.*
C. foliis linearibus, haſtato-acuminatis; calycibus ſagittatis.
Ex Madagaſcaria. *Commerſ.*

2010. CONVOLVULUS *haſtatus.*
C. foliis linearibus, haſtato-acuminatis; auriculis dentatis; foliolis calycinis ſimplicibus.
Ex India. *Rheed. mal. 11. t. 55.*

2011. CONVOLVULUS *tridentatus.*
C. foliis cuneiformibus, tricuſpidatis; baſi dilatata, dentatis; pedunculis unifloris. *Ait.*
Ex Ind. orientalibus. ⊙ *Evolv. tridentatus.* L.

2012. CONVOLVULUS *jalapa.* T. 104. f. 2.
C. foliis difformibus; inferioribus ſubcordatis, triangularibus; ſuperioribus ovato-lanceolatis; caule volubili.
E Mexico. ♆

2013. CONVOLVULUS *grandiflorus.*
C. foliis cordatis, acutis, longè petiolatis; pedunculis brevibus, unifloris; corolla ampla infundibuliformi.
E Martinica. ♆ *Jacq. hort. 3. t. 69.*

2014. LISERON *de Java*. Dict. n°. 15.
L. à feuilles en cœur, non divisées; tige subpubescente : pédoncules épaissis, uniflores; calices glabres.
L. n. l'isle de Java. ⊙ *Cor. blanche, à fond pourpre brun.*

2015. LISERON *trinerve*. Dict. n°. 16.
L. à feuilles en cœur, oblongues, glabres, trinerves; tige volubile, cylindrique; péd. uniflores.
L. n. le Japon. *Feuilles oppoſées. Seroit-ce un échites ?*

2016. LISERON *feuilles de Saules*. Dict. n° 17.
L. à feuilles lancéolées, dentées, à pétioles courts; calice anguleux.
L. n. Saint-Domingue.

2017. LISERON *uniflore*. Dict. n°. 18.
L. à tige volubile; feuilles lancéolées; pédoncules uniflores, deux bractées ovales.
L. n. l'isle de Java. *Pédoncules courts.*

2018. LISERON *luisant*. Dict. n°. 19.
L. à feuilles ovales, luisantes, blanches & soyeuses en-dessous; pédonc. uniflores, plus courts que les pétioles.
L. n. l'Inde, les Philippines.

2019. LISERON *feuilles de tilleul*. Dict. n°. 20.
L. frutiqueux, à feuilles en cœur, arrondies, les plus jeunes un peu tomenteuses; fleur & fruit fort grands.
L. n. l'isle de France. ♄

2020. LISERON *feuilles d'anserine*. Dict. n° 21.
L. velu, à feuilles ovales, dentées, sinuées; fleurs solitaires, presque sessiles.
L. n. . . . . Bractées filiformes. Cor. étroites.

2021. LISERON *de Dillen*. Dict. n°. 22.
L. à feuilles en cœur, entières & à trois lobes; fleurs solitaires, presque sessiles.
L. n. l'Afrique ? ⊙ *Fl. bleue, à fond blanchâtre.*

2022. LISERON *découpé*. Dict. n°. 23.
L. à feuilles palmées, glabres, partagées en sept digitations, dentées, sinuées; tige pileuse; péd. uniflores.
L. n. l'Amérique. ⊙ *Cor. blanche.*

2014. CONVOLVULUS *obscurus*.
C. foliis cordatis, indivisis; caule subpubescente; pedunculis incrassatis, unifloris; calycibus glabris.
Ex Java. ⊙ *Dill. Elth. t. 83. f. 95.*

2015. CONVOLVULUS *trinervis*.
C. foliis cordatis, oblongis, glabris, trinerviis; caule volubili tereti; pedunculis unifloris. *Th.*.
Ex Japonia. *Thunb. Fl. Jap. 85.*

2016. CONVOLVULUS *salicifolius*.
C. foliis lanceolatis, serratis, breviter petiolatis; calyce angulato.
E Domingo.

2017. CONVOLVULUS *uniflorus*.
C. caule volubili; foliis lanceolatis; pedunculis unifloris; bracteis duabus ovatis. B.
Ex Java. *Burm. Fl. ind. t. 21. f. 2.*

2018. CONVOLVULUS *nitidus*.
C. foliis ovalibus, nitidis, subtus albo-sericeis; pedunculis unifloris, petiolo brevioribus.
Ex India, Philippinis.

2019. CONVOLVULUS *tiliæfolius*.
C. fruticosus, foliis cordatis, rotundatis; junioribus subtomentosis; flore fructuque maximis.
Ex insula Franciæ. ♄ *Commerſ.*

2020. CONVOLVULUS *chenopodiodes*.
C. villosus, foliis ovatis, serrato-sinuatis; floribus solitariis, subsessilibus.
Ex . . . . . (*In herb. D. Juſſ.*)

2021. CONVOLVULUS *dillenii*.
C. foliis cordatis, integris trilobisque; floribus solitariis, subsessilibus.
Ex Africa ? ⊙ *Dill. Elth. t. 81. f. 93.*

2022. CONVOLVULUS *dissectus*.
C. foliis palmatis, septempartitis, dentato-sinuatis, glabris; caule piloso; pedunculis unifloris.
Ex America. ⊙ *Jacq. obſ. 2. t. 28.*

2023. LISERON *à gros fruits*. Dict. n°. 24.
L. à feuilles palmées, pédiaires, part. en cinq; pédoncules uniflores.
L. n. la Martinique. *Fl. purpurine.*

2024. LISERON *tuberculeux*. Dict. n°. 25.
L. à feuilles digitées, subpédiaires, part. en sept, glabres; pétioles rudes, tuberculeux; péd. uniflores.
L. n. Monte-Video. ♆

2025. LISERON *stipulé*. Dict. n°. 26.
L. à feuilles palmées, pinnatifides-dentées; pédoncules comprimées, uniflores; calice muriqué.
L. n. le Levant. *Fl. blanches, petites.*

2026. LISERON *lacinié*. Dict. n°. 27.
L. à feuilles découpées tres-menu, subbipinnées; péd. uniflores; calice du fruit presque glabre.
L. n. Monte-Video. *Pl. velue, pileuse.*

2027. LISERON *des rives*. Dict. n°. 28.
L. à feuilles oblongues, lobées, palmées; pédoncules uniflores; tige rampante.
L. n. les Antilles. *Cor. blanche.*

2028. LISERON *de la Martinique*. Dict. n° 29.
L. à feuilles elliptiques, glabres; pédoncules unifl. plus longs que les feuilles; tige rampante.
L. n. la Martinique. *Fl. blanches.*

2029. LISERON *rampant*. Dict. n°. 30.
L. à feuilles oblongues, obt. sagittées, entières postérieurement; tige rampante; péd. uniflores.
L. n. les lieux marit. de l'Amérique. ♆

2030. LISERON *feuilles étroites*. Dict. n°. 32.
L. à feuilles linéaires, un peu obtuses, oreillées à la base, presque sessiles; fleurs solit. jaunes.
L. n. la Guinée. *Cor. infundib. Capsf. 2-locul.*

2031. LISERON *horizontal*. Dict. n°. 33.
L. filiforme, presque droit; feuilles linéaires-mucronées; péd. très-ouverts, plus longs que les feuilles.
L. n. la Caroline.

2023. CONVOLVULUS *macrocarpus*.
C. foliis palmato-pedatis, quinquepartitis; pedunculis unifloris.
E Martinica. *Burm. amer. t. 91. f. 1.*

2024. CONVOLVULUS *tuberculatus*.
C. foliis digitatis, subpedatis, septempartitis, lævibus; petiolis tuberculato asperis; pedunculis unifloris.
E Monte-Video. ♆ *Fl. purpureo-violacei.*

2025. CONVOLVULUS *stipulatus*.
C. foliis palmatis, pinnatifido-serratis; pedunculis compressis, unifloris; calyce muricato.

Ex Oriente. *Barrel. ic. 319.*

2026. CONVOLVULUS *laciniatus*.
C. foliis teniter laciniatis, subbipinnatis; pedunculis unifloris; calyce fructus nudiusculo.

E Monte Video. *Commerf. Var. cal. hirsutiff.*

2027. CONVOLVULUS *littoralis*.
C. folis oblongis, lobato-palmatis; pedunculis unifloris; caule repente.
Ex inf. Caribæis. *Burm. Amer. t. 90. f. 2.*

2028. CONVOLVULUS *Martinicenfis*.
C. foliis ellipticis, glabris; pedunculis unifloris, folio longioribus; caule repente.
E Martinica. *Jacq. Amer. t. 17.*

2029. CONVOLVULUS *repens*.
C. foliis oblongis, obtusè sagittatis, posticè integris; caule repente; pedunculis unifloris.

Ex Americæ maritimis. ♆ *Plum. Amer. t. 106.*

2030. CONVOLVULUS *anguftifolius*.
C. foliis linearibus, obtusiusculis, basi auriculatis, sub-sessilibus; flore solitario, luteo.

Ex Guinea. *Ipomea anguftif. Jacq. Ic. rar.*

2031. CONVOLVULUS *patens*.
C. filiformis, suberectus; foliis linearibus, mucronatis; pedunculis patentissimis, folio longioribus.
Ex Carolinia. *Fraset.*

2032. LISERON *onagroïde*. Dict. n°. 34.
L. frutiqueux, droit; feuilles linéaires, blanchâtres; péd. axillaires, solitaires, uniflores, bracteiſères; calices glabres.
L. n. le Cap de B. Eſpérance. ♄ *Cal. lancéolés.*

2033. LISERON *tricolor*. Dict. n°. 35.
L. à feuilles lancéolées-ovales, ſubvilleuſes; tiges montantes; pédoncules un peu longs, uniflores; calice pileux.
L. n. l'Eſpagne, &c. ☉ *Fl. bleues, à fond blanc & jaune.*

2034. LISERON *pentapétaloïde*. Dict. n°. 36.
L. à feuilles lancéolées, obtuſes; péd. uniflores, plus courts que les feuilles; calice nud, ſcarieux.
L. n. l'Italie, &c. ☉ *Convolv. humilis. Jacq* ?

2035. LISERON *épineux*. Dict. n°. 37.
L. frutiqueux, droit; feuilles lancéolées, ſoyeuſes; rameaux florifères, épineux.
L. n. la Ruſſie. ♄ *Comm. par M. Patrin.*

2036. LISERON *dorycne*. Dict. n°. 38.
L. à tige frutiqueuſe, paniculée; feuilles preſque linéaires, ſoyeuſes; calices obtus, preſque glabres.
L. n. le Levant. ♄ *Fl. ſeſſiles dans les bif. & au ſommet des rameaux.*

2037. LISERON *de Perſe*. Dict. n°. 39.
L. à feuilles ovales, tomenteuſes; pédoncules uniflores.
L. n. la Perſe. ♆

2038. LISERON *d'amman*. Dict. n°. 40.
L. ſoyeux, à feuilles linéaires; pédonc. axillaires, uniflores, à longues bractées; calice pointu.
L. n. la Sibérie. *Comm. par M. Patrin.*

2039. LISERON *feuilles de lavande*. Dict. n°. 41.
L. à feuilles linéaires-lancéolées, retrécies à la baſe; tige preſque ſimple; péd. plus courts que les feuilles.
L. n. l'Eſpagne. ♆

2032. CONVOLVULUS *œnotheroides*.
C. fruticoſus, erectus; foliis linearibus, caneſcentibus; pedunculis axillaribus, ſolitariis, bracteatis, unifloris; calycibus glabris.
E Cap. B. Spei. ♄ *Lin. f. ſuppl. 137.*

2033. CONVOLVULUS *tricolor*.
C. foliis lanceolato-ovatis, ſubvilloſis; caulibus aſcendentibus; pedunculis longiuſculis, unifloris; calyce piloſo.
Ex Hiſpania, &c. ☉ *Fl. cyanei; fundo albo luteoque.*

2034. CONVOLVULUS *pentapetaloides*.
C. foliis lanceolatis, obtuſis; pedunculis unifloris, folio brevioribus; calyce nudo, ſcarioſo.
Ex Italia, &c. ☉ *Cor. vix ſemiquinquefida.*

2035. CONVOLVULUS *ſpinoſus*.
C. fruticoſus erectus; foliis lanceolatis, ſericeis; ramis floriferis, ſpinoſis.
Ex Ruſſia. ♄ *Pall. it. 2. tab. m.*

2036. CONVOLVULUS *dorycnium*.
C. caule fruticoſo, paniculato; foliis ſublinearibus, ſericeis; calycibus nudiuſculis, obtuſis.
Ex Oriente. ♄ *Fl. ſeſſiles in dichot. & apicibus ramorum.*

2037. CONVOLVULUS *Perſicus*.
C. foliis ovalibus, tomentoſis; pedunculis unifloris.
Ex Perſia. ♆ *Gmel. It. 3. t. 7.*

2038. CONVOLVULUS *ammanii*.
C. ſericeus, foliis linearibus; pedunculis axillaribus, unifloris, longè bracteatis; calyce acuto.
E Sibiria. *Pl. ſericeo-argentea.*

2039. CONVOLVULUS *ſpicæfolius*.
C. foliis lineari-lanceolatis, baſi anguſtatis; caule ſubſimplici; pedunculis folio brevioribus.
Ex Hiſpania. ♆ *Barrel. Ic. 311.*

2040. LISERON *ſoldanelle*. Dict. n°. 42.
L. à feuilles réniformes, à longs pétioles : bractées couvrant le calice.
L. n. les lieux marit. de la France, l'Eſp., l'Angleterre, &c. ☉

2041. LISERON *ſtoloniſère*. Dict. n°. 43.
L. traînant, à feuilles oblongues-ovales, rétuſes, échancrées à la baſe & au ſommet : les inférieures non diviſées ; les ſup. ſinuées & lobées latéralement.
L. n. les rives maritimes de l'Italie. ♆ *Pl. laiteuſe ; cor. d'un blanc jaunâtre.*

2042. LISERON *des ſables*. Dict. ſuppl.
L. à feuilles oblongues, échancrées, lobées ou entières à la baſe ; péd. uniflores ; corolles tubuleuſes.
L. n. les iſles Açores. *Pl. glabre ; tiges couchées.*

* * *Pédoncules multiflores.*

2043. LISERON *maritime*. Dict. n°. 44.
L. à feuilles échancrées, bilobées, entières à la baſe ; pédonc. ſubmultifl. tige couchée.
L. n. les riv. maritimes des Indes.

2044. LISERON *piloſelle*. Dict. n°. 45.
L. à feuilles lancéolées, entières, ſeſſiles, pileuſes ſur les bords ; pédonc. à ramif. lâches.
L. n. le Levant.

2045. LISERON *linaire*. Dict. n°. 46.
L. pileux, à feuilles linéaires-lancéolées, pointues ; tige rameuſe, un peu droite, fleurs ramaſſées.
L. n. l'Europe auſtrale ♆

2046. LISERON *lanugineux*. Dict. n°. 47.
L. blanc, tomenteux, droit ; feuilles linéaires ; fleurs terminales, en tête.
L. n. l'Eſpagne. ♆

2047. LISERON *argenté*. Dict. n°. 48.
L. frutiqueux, ſoyeux, à feuilles oblongues, obtuſes ; fl. en ombelle, capitées, terminales ; calice court, obtus.
L. n. l'Iſle de Candie. ♄

2040. CONVOLVULUS *ſoldanella*.
C. foliis reniformibus, longè petiolatis ; bracteis calycem obtegentibus.
Ex Galliæ, Hiſpaniæ, Angliæ, &c. maritimis. ☉

2041. CONVOLVULUS *ſtoloniferus*.
C. humifuſus, foliis oblongo-ovalibus, retuſis, baſi apiceque emarginatis : inferioribus indiviſis ; ſuperioribus latere ſinuato-lobatis.
Ex Italiæ litt. marit. ♆ *Cyril. rar. t. 5. conv. imperati. Vahl. ſymb. p. 17.*

2042. CONVOLVULUS *arenarius*.
C. foliis oblongis, emarginatis, baſi lobatis integriſve ; pedunculis unifloris ; corollis tubuloſis.
Ex inſulis Azoricis. *Vahl. ſymbol. p. 18.*

** *Pedunculi multiflori.*

2043. CONVOLVULUS *maritimus*.
C. foliis emarginato-bilobis, baſi integris ; pedunculis ſubmultifloris ; caule decumbente.
Ex Indiarum littoribus maritimis.

2044. CONVOLVULUS *piloſellæfolius*.
C. foliis lanceolatis, integris, ſeſſilibus, margine piloſis ; pedunc. elongatis, laxè ramoſis.
Ex Oriente. *Juſſ. herb.*

2045. CONVOLVULUS *cantabrica*.
C. piloſus, foliis lineari lanceolatis, acutis ; caule ramoſo, erectiuſculo ; floribus congeſtis.
Ex Europa auſtr. ♆

2046. CONVOLVULUS *lanuginoſus*.
C. tomentoſo-incanus, erectus ; foliis linearibus ; floribus terminalibus, capitatis.
Ex Hiſpania. ♆ *Barrel. Ic. 470.*

2047. CONVOLVULUS *argenteus*.
C. fruticoſus, ſericeus ; foliis oblongis, obtuſis ; floribus capitato-umbellatis, terminalibus ; calyce brevi obtuſo.
E Creta. ♄ *An C. cneorum. L.*

2048. LISERON *feuilles d'olivier*. Dict. n°. 49.
L. frutiqueux, soyeux, à feuilles linéaires-lancéolées; fl. en ombelle capitée, terminales; cal. lancéolés.
L. n. le Levant. ♄

2049. LISERON *thyrsoïde*. Dict. n°. 50.
L. frutiqueux, à feuilles linéaires lancéolées, glabres; panicule thyrsoïde, terminale.
L. n. l'isle de Ténériffe. ♄ *Capf. 1-sperme. Jacq.*

2050. LISERON *effilé*. Dict. n°. 51.
L. frutiqueux, droit, glabre; rameaux effilés, feuilles sessiles, linéaires; grappe terminale; pédoncules subtriflores.
L. n. les Canaries. ♄ *Le bois de Rhodes.*

2051. LISERON *unilatéral*. Dict. n°. 52.
L. tomenteux, ferrugineux, à feuilles sessiles, lancéolées; têtes unilat. nombreuses, presque sessiles.
L. n. le Levant. *Pl. droite, laineuse, tomenteuse.*

2052. LISERON *rayé*. Dict. n°. 53.
L. tomenteux, soyeux, à feuilles oblongues, obtuses, rétrécies à la base, rayées; pédonc. biflores, plus courts que les feuilles.
L. n. la France mérid. ♃ *Tiges de 3 à 4 pouces.*

2053. LISERON *comestible*. Dict. n°. 54.
L. à feuilles en cœur, glabres, entières & à trois lobes; tige rampante, anguleuse.
L. n. le Japon. *Est-ce un Ipomæa, comme la Batate?*

2054. LISERON *sublobé*. Dict. n°. 54.
L. couché, à feuilles supérieures, dentées & ondées au sommet; fleurs en tête.
L. n. les Indes orientales. ☉

2055. LISERON *azuré*. Dict. n°. 56.
L. à feuilles presqu'en cœur, pointues, glabres; fl. ramassées en tête dichotome, à très-longs pédoncules.
L. n. l'Amérique mérid. ♄

2056. LISERON *capité*. Dict. n°. 57.
L. pileux, à feuilles en cœur; fleurs capitées, à collerette; péd. à peine plus longs que les pétioles.
L. n. le Sénégal. *Tiges volubiles.*

2048. CONVOLVULUS *olæfolius*.
C. fruticosus, sericeus; foliis lineari-lanceolatis; floribus capitato-umbellatis, terminalibus; calycibus lanceolatis.
Ex Oriente. ♄ *Nimis affinis præcedenti.*

2049. CONVOLVULUS *floridus*.
C. fruticosus, foliis lineari-lanceolatis, glabris; panicula thyrsoidea terminali.
Ex insul. Teneriffæ. ♄ *Jacq. collect. 1. & ic. rar.*

2050. CONVOLVULUS *scoparius*.
C. fruticosus, erectus, glaber; ramis virgatis; foliis sessilibus, linearibus; racemo terminali; pedunculis subtrifloris.
E Canariis. ♄ *L. f. suppl. 135.*

2051. CONVOLVULUS *secundus*.
C. tomentoso-ferrugineus; foliis sessilibus, lanceolatis; capitulis secundis, crebris, subsessilibus.
Ex Oriente. *Conv. lanatus. Vahl. symb. 16?*

2052. CONVOLVULUS *lineatus*.
C. tomentoso-fericeus; foliis oblongis, obtusis, basi attenuatis, lineatis; pedunculis bifloris, folio brevioribus.
Ex Gallia austr. ♃

2053. CONVOLVULUS *edulis*.
C. foliis cordatis, integris, trilobisque, glabris; caule repente, angulato.
Ex Japonia. *Thunb. fl. Jap. 84.*

2054. CONVOLVULUS *sublobatus*.
C. procumbens, foliis superioribus, apice dentato-repandis; floribus capitatis.
Ex Indiis orient. ☉ *L. f. suppl. 135.*

2055. CONVOLVULUS *azureus*.
C. foliis subcordatis, acutis, nudis; floribus in capitulum dichotomum, collectis, longissimè pedunculatis.
Ex America merid. ♄ *D. Richard.*

2056. CONVOLVULUS *capitatus*.
C. pilosus, foliis cordatis; floribus capitatis, involucratis; pedunculis petiolo vix longioribus.
E Senegal. *Geoffroy.*

2057. LISERON *de Guiane*. Dict. n°. 58.
L. à feuilles presqu'en cœur, mucronées, tomenteuses; fl. en tête, à très-longs pédonc.
L. n. la Guiane. *Pl. tomenteuse, volubile.*

2057. CONVOLVULUS *Guianensis*.
C. foliis subcordatis, mucronatis, tomentosis; floribus capitatis, longissimè pedunculatis.
Ex Guiana. *Aubl. t. 52.*

2058. LISERON *de S. Domingue*. Dict. n°. 59.
L. à feuilles en cœur; grappes nombreuses, unilatérales : calice pointu, glabre.
L. n. Saint-Domingue. *Pl. volubile.*

2058. CONVOLVULUS *Domingensis*.
C. foliis cordatis; racemis numerosis, secundis; calyce acuto glabro.
E Domingo. *Juss. herb.*

2059. LISERON *filiforme*. Dict. n°. 60.
L. à feuilles presqu'en cœur, obtuses, mucronées; pédonc. rameux; fleur tubuleuse
L. n. les Antilles. *Pl. glabre, volubile.*

2059. CONVOLVULUS *filiformis*.
C. foliis subcordatis, obtusis, mucronatis; pedunculis ramosis; flore tubuloso.
Ex inf. Caribæis. *Ipomæa filiformis. Jacq.*

2060. LISERON *ondé*. Dict. n°. 61.
L. à feuilles presqu'en cœur, ovales, acuminées, ondées; pédoncules ramifiés, en cime; fl. tubuleuse.
L. n. la Martinique. *Pl. glabre. Cor. écarlate.*

2060. CONVOLVULUS *repandus*.
C. foliis subcordato-ovatis, acuminatis, repandis; pedunculis ramoso-cymosis; flore tubuloso.
E Martinica. *Ipomæa repanda. Jacq.*

2061. LISERON *à corymbes*. Dict. n°. 62.
L. à feuilles en cœur, glabres; pédoncules à ombelles; fleur blanche.
L. n. Saint-Domingue. *Pl. glabre. Cal. obtus.*

2061. CONVOLVULUS *corymbosus*.
C. foliis cordatis, lævibus; pedunculis umbellatis; flore niveo.
E Domingo. *Burm. amer. t. 89. f. 2.*

2062. LISERON *à ombelles*. Dict. n°. 63.
L. à feuilles en cœur; pétioles garnis de stip. à la base; pédonc. à ombelles; fleur jaune.
L. n. Saint-Domingue, la Martinique. ♃

2062. CONVOLVULUS *umbellatus*.
C. foliis cordatis; petiolis basi stipulaceis; pedunculis umbellatis; flore luteo.
E Domingo, Martinica. ♃ *Plum. amer. t. 102.*

2063. LISERON *en cîme*. Dict. n°. 64.
L. à feuilles en cœur à la base, oblongues, acuminées; péd. en cîme; fruit penché.
L. n. les Indes orient. *Sonnerat.*

2063. CONVOLVULUS *cymosus*.
C. foliis basi cordatis, oblongis, acuminatis; pedunculis cymosis; fructu cernuo.
Ex Indiis orient. *Rumph. amb. 5. t. 158.*

2064. LISERON *des Canaries*. Dict. n°. 65.
L. à feuilles en cœur, pointues, un peu tomenteuses, molles; péd. axillaires, triflores, un peu longs.
L. n. les isles Canaries. ♄

2064. CONVOLVULUS *Canariensis*.
C. foliis cordatis, acutis, subtomentosis, mollibus; pedunculis axillaribus, trifloris, longiusculis.
Ex inf. Canariensibus. ♄ *Commel. h. 2. t. 51.*

2065. LISERON *à petites fleurs*. Dict. n°. 66.
L. à feuilles en cœur-oblongues, mucronées; pédoncules rameux, multiflores, courts, comme verticillés.
L. n. Saint Domingue. *Jos. Martin.*

2065. CONVOLVULUS *paviflorus*.
C. foliis cordato-oblongis, mucronatis; pedunculis ramosis, multifloris, brevibus, quasi verticillatis.
E Domingo. *Burm. Amer. t. 94. f. 2.*

2066. LISERON *nodiflore*. Dict. n°. 67.
L. à feuilles ovales-pointues, ſubtomenteuſes, molles; péd. axillaires, multiflores, très-courts.
L. n. Saint-Domingue. *Joſ. Martin.*

2067. LISERON *de Malabar*. Dict. n°. 68.
L. à feuilles en cœur, glabres; tige perſ. villeuſe.
L. n. le Malabar. ♄

2068. LISERON *de Chine*. Dict. n°. 69.
L. hériſſé, à feuilles en cœur, pointues; pédoncules ſubmultiflores, courts; calice en cœur.
L. n. la Chine.

2069. LISERON *biflore*. Dict. n°. 70.
L. à feuilles en cœur, pubeſcentes; pédoncules geminées; corolles à lobes trifides.
L. n. la Chine. ⊙

2070. LISERON *geminé*. Dict. n°. 71.
L. à tige volubile; feuilles en cœur, glabres; pédoncules biflores.
L. n. l'iſle de Java. *Cor. blanches.*

2071. LISERON *bordé*. Dict. n°. 72.
L. à feuilles en cœur, pointues, liſſes, bordées de rouge; pédoncules multiflores.
L. n. le Malabar.

2072. LISERON *muriqué*. Dict. n°. 73.
L. a feuilles en cœur; pédoncules épaiſſis & liſſes, ainſi que les calices; tige muriquée.
L. n. Surate. *Cor. purpurine.*

2073. LISERON *crénélé*. Dict. n°. 74.
L. tomenteux, à feuilles en cœur-oblongues, obtuſes, obſcurément ſinuées; péd. plus longs que les pétioles; limbe pointu.
L. n. le Pérou. ♄ *Dombey. Cor. blanche.*
β. *Liſeron rongé. Dict. n°. 75.*

2074. LISERON *pliſſé*. Dict. n°. 76.
L. tomenteux, à feuilles en cœur, pointues, dentées, ridées, pliſſées; pédonc. ſubbiflores.
L. n. le Cap de B. Eſpérance.

2066. CONVOLVULUS *nodiflorus*.
C. foliis ovato-acutis, ſubtomentoſis, mollibus; pedunculis axillaribus, multifloris, breviſſimis.
E Domingo.

2067. CONVOLVULUS *Malabaricus*.
C. foliis cordatis, glabris; caule perenni villoſo.
Ex Malabaria. ♄ *Rheed. 11. tab. 51.*

2068. CONVOLVULUS *Sinenſis*.
C. hirtus; foliis cordatis, acutis; pedunculis ſubmultifloris, brevibus; calyce cordato.
E China. (*herb. Juſſ.*)

2069. CONVOLVULUS *biflorus*.
C. foliis cordatis, pubeſcentibus; pedunculis geminis; corollis lobis trifidis. L.
E China. ⊙

2070. CONVOLVULUS *gemellus*.
C. caule volubili: foliis cordatis, glabris; pedunculis bifloris. B.
Ex Java. *Burm. Fl. Ind. 46. t. 21. f. 1.*

2071. CONVOLVULUS *marginatus*.
C. foliis cordatis, acutis, lævibus, rubro marginatis; pedunculis multifloris.
Ex Malabaria. *Rheed. mal. 11. t. 53.*

2072. CONVOLVULUS *muricatus*.
C. foliis cordatis; pedunculis incraſſatis calycibuſque lævibus; caule muricato.
Ex Surata. *Lin. Mant. 44.*

2073. CONVOLVULUS *crenatus*.
C. tomentoſus, foliis cordato-oblongis, obtuſis, ſubrepandis; pedunculis petiolo longioribus; limbo acuto.
E Peru. ♄ *Jacq. Ic. rar. C. hermanniæ. L'Her.*
β. *Convolvulus eroſus.*

2074. CONVOLVULUS *plicatus*.
C. tomentoſus, foliis cordatis, acutis, angulato-ſerratis, rugoſis plicatis; ped. ſubbiflor.
E Cap. B. Spei. *Sonnerat.*

2075. LISERON *ſoyeux*. Dict. n°. 77.
L. à feuilles lancéolées, elliptiques, tomenteuſes & ſoyeuſes en-deſſous; pédonc. ſubtriflores; calice court, pileux.
L. n. l'iſle de Java. ♄

2075. CONVOLVULUS *ſericeus*.
C. foliis lanceolato-ellipticis, ſubtus tomentoſo-ſericeis; pedunculis ſubtrifloris; calyce brevi piloſo.
Ex Java. ♄ *C. mollis. Burm. Fl. ind. t. 17.*

2076. LISERON *délicat*. Dict. n°. 78.
L. volubile, à feuilles oblongues, elliptiques, obtuſes, mucronées, preſque ſeſſiles; péd. ſubbiflores, plus longs que les feuilles.
L. n. la Caroline. *Fraſer.*

2076. CONVOLVULUS *tenellus*.
C. volubilis, foliis oblongo ellipticis, obtuſis, mucronatis, ſubſeſſilibus; pedunculis foliis longioribus, ſubbifloris.
E Carolina. *Pluk. t. 166. f. 4.*

2077. LISERON *farineux*. Dict. n°. 79.
L. à feuilles en cœur, acuminées, ondées; pédoncules triflores; tige farineuſe au ſom.
L. n. l'iſle de Madère. ☉

2077. CONVOLVULUS *farinoſus*.
C. foliis cordatis, acuminatis, repandis; pedunculis trifloris; caule apice farinoſo.
Ex Madera. ☉ *Jacq. hort. 1. t. 36.*

2078. LISERON *de Sibérie*. Dict. n°. 80.
L. à feuilles en cœur, acuminées, glabres; pédonc. biflores; ſtipules rétuſes, décurrentes.
L. n. la Sibérie. ☉

2078. CONVOLVULUS *Sibiricus*.
C. foliis cordatis, acuminatis, lævibus; pedunculis bifl.; ſtipulis retuſis, decurrentibus.
E Sibiria. ☉ *C. rupeſtris. Pall. it. 3. t. K.*

2079. LISERON *ſcammonée*. Dict. n°. 81.
L. à feuilles triangulaires, ſagittées; pédonc. cylindriques, ſubtriflores, une fois plus longs que les feuilles.
L. n. le Levant. ♆

2079. CONVOLVULUS *ſcammonnia*.
C. foliis triangularibus, ſagittatis; pedunculis teretibus, ſubtrifloris, folio duplo longioribus.
Ex Oriente. ♆

2080. LISERON d'*Adanſon*. Dict. n°. 82.
L. à feuilles haſtées, linéaires; ſtipules geminées, ſubfiliformes; calice muriqué.
L. n. le Sénégal. *Adanſ.*

2080. CONVOLVULUS *Adanſonii*.
C. foliis haſtatis, linearibus; ſtipulis geminis, ſubfiliformibus; calyce muricato.
E Senegal. (*Herb. Juſſ.*)

2081. LISERON *hériſſé*. Dict. n°. 83.
L. à feuilles en cœur & ſubhaſtées, velues; tige & pétioles pileux; pédoncules multiflores.
L. n. les Indes orientales.

2081. CONVOLVULUS *hirtus*.
C. foliis cordatis, ſubhaſtatiſque, villoſis; caule petiolisque piloſis; ped. multifloris.
Ex Indiis orientalibus.

2082. LISERON *hypocratériforme*. Dict. n. 84.
L. à feuilles en cœur; corolle hypocratériforme; limbe quinquefide: à déc. échancrée.
L. n. les Indes orientales. ♄

2082. CONVOLVULUS *hypocrateriformis*.
C. foliis cordatis; corolla hypocrateriformi; limbo quinquefido: laciniis emarginatis.
Ex Indiis orientalibus. ♄

2083. LISERON *à larges fleurs*. Dict. n. 85.
L. à feuilles en cœur, glabres; pédoncules ſubtriflores; corolle hypocratériforme, très-grande.
L. n. Saint-Domingue, &c. *Cor. blanche.*

2083. CONVOLVULUS *latiflorus*.
C. foliis cordatis, glabris; pedunculis ſubtrifloris; corolla hypocrateriformi, maxima.
E Domingo, &c. *Cor. alba.*

2084. LISERON *turbith.* Dict. n. 86.
L. à feuilles en cœur, anguleuses; tige à quatre angles membraneux; pédoncules multiflores.
L. n. le Malabar, l'isle de Céylan. ♆

2085. LISERON *nerveux.* Dict. n°. 87.
L. à feuilles en cœur, multinerves, tomenteuses & soyeuses en-dessous; pédoncules à ombelle, multiflores.
L. n. les Indes orient. ♄ *Pl. volubile.*

2086. LISERON *pelté.* Dict. n°. 88.
L. à feuilles peltées; pédoncules multiflores.
L. n. Amboine, &c. *Tiges lign. volubiles.*

2087. LISERON *feuilles d'asaret.* Dict. n°. 89.
L. à feuilles réniformes, larges, veineuses, glabres; tige volubile; pédonc. subbiflores.
L. n. le Sénégal. *Cor. grande, tubuleuse.*

2088. LISERON *de Caroline.* Dict. n°. 90.
L. à feuilles velues, en cœur, entières & trilobées; tiges glabres; capsules velues; péd. subbiflores.
L. n. la Caroline. ♆

2089. LISERON *panduriforme.* Dict. n°. 91.
L. à feuilles les unes en cœur entières, les autres panduriformes ou à trois lobes; péd. subbiflores, plus longs que les pétioles.
L. n. l'Amér. septentr. ♆

2090. LISERON *hédéracé.* Dict. n°. 92.
L. à feuilles en cœur, entières & à trois lobes, péd. subtriflores; calice ponctué.
L. n. le Mexique. ☉ *Cor. purpurine.*

2091. LISERON *tomenteux.* Dict. n°. 93.
L. à feuilles trilobées, tomenteuses; tige lanugineuse.
L. n. la Jamaïque. *Tiges volubiles.*

2092. LISERON *trilobé.* Dict. n°. 94.
L. à feuilles inférieures, en cœur, trilobées; les sup. à cinq lobes; péd. triflores.
L. n. l'Amérique méridionale. ☉

2084. CONVOLVULUS *turpethum.*
C. foliis cordatis, angulatis; caule membranaceo quadrangulari; pedunculis multifloris.
Ex Malabaria, Zeylona. ♆ *Blackw. t. 397.*

2085. CONVOLVULUS *nervosus.*
C. foliis cordatis, multinerviis, subtus tomentoso-sericeis; pedunculis umbellatis, multifloris.
Ex Indiis orient. ♄ *Burm. Fl. ind. t. 20. f. 1.*

2086. CONVOLVULUS *peltatus.*
C. foliis peltatis; pedunculis multifloris.
Ex Amboina, &c. *Rumph. 5. t. 157.*

2087. CONVOLVULUS *asarifolius.*
C. foliis reniformibus, latis, venosis, nudis; caule volubili; pedunculis subbifloris.
E Senegal. *Roussillon.*

2088. CONVOLVULUS *Carolinus.*
C. foliis cordatis, integris trilobisque villosis; caulibus lævibus; capsulis hirsutis; pedunculis subbifloris.
Ex Carolina. ♆ *Dill. elth. t. 84. f. 98.*

2089. CONVOLVULUS *panduratus.*
C. foliis aliis cordatis integris, aliis panduriformibus trilobisve; pedunculis petiolo longioribus, subbifloris.
Ex America sept. ♆ *Dill. Elth. t. 85. f. 99.*

2090. CONVOLVULUS *hederaceus.*
C. foliis cordatis, integris trilobisque; pedunculis subtrifloris; calyce punctato.
E Mexico. ☉ *Dill. Elth. t. 83. f. 96.*

2091. CONVOLVULUS *tomentosus.*
C. foliis trilobis, tomentosis; caule lanuginoso. L.
Ex Jamaica. *Sloan. 1. t. 98. f. 2.*

2092. CONVOLVULUS *trilobus.*
C. foliis inferioribus, cordatis, trilobis; superioribus quinquelobis; pedunculis trifloris.
Ex America merid. ☉ *Ipomœa triloba. L.*

2093. LISERON *acetoſelle*. Dict. n°. 95.
L. légèrement muriqué, à feuilles haſtées, trilobées : à lobes latéraux, arrondis, anguleux ; pédoncules courts, ſubbiflores.
L. n. l'iſle de France.

2094. LISERON *bicolor*. Dict. n°. 96.
L. hériſſé, volubile ; à feuilles en cœur, trilobées, blanches en-deſſous ; péd. multiflores.
L. n. le Sénégal.

2095. LISERON *althéiforme*. Dict. n°. 97.
L. à feuilles inf. en cœur, ſinuées ; les ſupérieures pinnatifides, lobées, preſque palmées ; pédoncules la plupart biflores.
L. n. la France méridionale. ♆

2096. LISERON *feuilles d'alcée*. Dict. ſuppl.
L. vleu, à feuilles toutes prof. laciniées, preſque palmées ; pédonc. pauciflores, plus longs que les feuilles.
L. n. le Cap de B. Eſpérance.

2097. LISERON *tamnoïde*. Dict. ſuppl.
L. à feuilles en cœur, aeuminées : fleurs ramaſſées, preſque ſeſſiles ; bractées & calices pileux.
L. n. la Caroline. ⊙ *Capſ. 2-loculaires.*

2098. LISERON *anguleux*. Dict. n°. 98.
L. à feuilles en cœur, quinqu'angulaires, très-entières, velues ; pédoncules multiflores.
L. n. les Indes orientales.

2099. LISERON *feuilles de vigne*. Dict. n°. 99.
L. à feuilles palmées, à cinq lobes, glabres, dentées ; tige pileuſe ; pédoncules multiflores.
L. n. les Indes orientales.

2100. LISERON *paniculé*. Dict. n°. 100.
L. à feuilles palmées : à ſept lobes ovales, pointus, très-entiers ; pédoncules paniculés.
L. n. le Malabar. *Rac. tubéreuſes. Tiges volub.*

2101. LISERON *pentaphylle*. Dict. n° 101.
L. très-pileux, à feuilles digitées, à cinq folioles ovales, acuminées ; péd. multiflores.
L. n. l'Amérique mérid. ⊙ *Fl. blanchâtres*

2093. CONVOLVULUS *acetoſellæfolius*.
C. leviter muricatus, foliis haſtato-trilobis : lobis lateralibus, ſubrotundo-angulosis ; pedunculis brevibus ſubbifloris.
Ex inſula Franciæ. *Commerſ.*

2094. CONVOLVULUS *bicolor*.
C. hirtus volubilis ; foliis ſubcordatis, trilobis, ſubtus incanis ; pedunculis multifloris.
E Senegal. *Geoffroy.*

2095. CONVOLVULUS *althæoides*.
C. foliis inferioribus cordatis, ſinuatis ; ſuperioribus pinnatifido-lobatis, ſubpalmatis ; pedunculis pleriſque bifloris.
Ex Gallia auſtrali. ♆

2096. CONVOLVULUS *alceifolius*.
C. hirſutus, foliis omnibus profundè laciniatis, ſubpalmatis ; pedunculis pauciflorís, folio longioribus.
E Capite Bonæ Spei.

2097. CONVOLVULUS *tamnifolius*.
C. foliis cordatis, acuminatis ; flor. aggregatis, ſubſeſſilibus ; bracteis calycibusque piloſis.
Ex Carolinia. ⊙ *Ipomæa tamnifolia. L.*

2098. CONVOLVULUS *angularis*.
C. foliis cordatis, quinquangularibus, integerrimis, villoſis ; pedunculis multifloris.
Ex Indiis orient. *Burm. Ind. t. 19. f. 2.*

2099. CONVOLVULUS *vitifolius*.
C. foliis palmatis, quinquelobis, glabris, dentatis ; caule piloſo ; pedunculis multifloris.
Ex Indiis orient. *Burm. Ind. t. 18. f. 1.*

2100. CONVOLVULUS *paniculatus*.
C. foliis palmatis : lobis ſeptenis ovatis, acutis, integerrimis ; pedunculis paniculatis.
Ex Malabaria. *Rheed. vol. 11. t. 49.*

2101. CONVOLVULUS *pentaphyllus*.
C. piloſiſſimus, foliis quinato-digitatis : foliolis ovatis, acuminatis ; ped. multifloris.
Ex Amer. mer. ⊙ *Ipomæa pentaphylla. Jacq.*

2102. LISERON *à cinq feuilles.* Dict. n°. 102.
L. à feuilles digitées, glabres, dentées; tige hispide; pédoncules multiflores.
L. n. Saint-Domingue. *Péd. plus longs que les f.*

2103. LISERON *cissoïde.* Dict. supp.
L. velu, à feuilles digitées, quinées, dentées; pédoncules subtriflores, plus courts que les feuilles; calice hispide.
L. n. Cayenne. *Bractées linéaires.*

2104. LISERON *glabre.* Dict. n°. 103.
L. à feuilles digitées, quinées; folioles ovales-lancéolées, très-entières, glabres; pédoncules multiflores.
L. n. Cayenne. *Pl. lactescente, volubile.*

2105. LISERON *veiné.* Dict. n°. 104.
L. glabre, à feuilles digitées; folioles pétiolées, ovales-acuminées, très-entières; pétioles communs en vrille à leur base.
L. n. l'Isle de France. *Pl. volubile.*

2106. LISERON *graines velues.* Dict. n°. 105.
L. frutiqueux, à feuilles digitées: à env. huit folioles linéaires, très-étroites; semences velues.
L. n. Saint-Domingue. ♄ *Capsf. à 2 loges.*

2107. LISERON *grosse racine.* Dict. n°. 106.
L. à feuilles digitées, à sept folioles ovales-lancéolées, un peu sinuées; tige glabre; pédoncules multiflores.
L. n. Saint-Domingue. *Pl. glabre, volubile.*

* LISERON (*du Caire*) à feuilles pinnées, palmées, dentées; pédoncules filiformes, paniculés; calices glabres.

* LISERON (*bicariné*) à feuilles en cœur; tige volubile, carinée de chaque côté.

* LISERON (*de la Havane*) à feuilles oblongues, luisantes; pédoncules uniflores.

* LISERON (*des chaumières*) volubile, à feuilles en cœur-sagittées, pointues; tige anguleuse; pédoncules tétragones, uniflores.

2102. CONVOLVULUS *quinquefolius.*
C. foliis digitatis, glabris, dentatis; caule hispido; pedunculis multifloris
E Domingo. *Burm. Amer. t. 91. f. 2.*

2103. CONVOLVULUS *cissoides.*
C. hirsutus: foliis quinato-digitatis, dentatis: pedunculis subtrifloris, folio brevioribus; calyce hispido.
E Cayenna. *Leblond.*

2104. CONVOLVULUS *glaber.*
C. foliis digitatis, quinatis; foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis, lævibus; pedunculis multifloris.
E Cayenna. *Aubl. Guian. t. 53.*

2105. CONVOLVULUS *venosus.*
C. glaber, foliis digitatis; foliolis petiolatis, ovato-acuminatis, integerrimis; petiolis communibus basi cirrhosis.
Ex inf. Franciæ. *Commerf.*

2106. CONVOLVULUS *eriospermus.*
C. fruticosus, foliis digitatis: foliolis subocto nis, linearibus, angustissimis; seminibus hirsutis.
E Domingo. ♄ (*Herb. Juss.*)

2107. CONVOLVULUS *macrorhizos.*
C. foliis digitatis, septenis: foliolis ovato-lanceolatis, subsinuatis; caule glabro; pedunculis multifloris.
E Domingo. *Burm. Amer. t. 90. f. 1.*

* CONVOLVULUS (*Cairicus*) foliis pinnato-palmatis, serratis; pedunculis filiformibus, paniculatis; calycibus lævibus. *Lin.*

* CONVOLVULUS (*anceps*) foliis cordatis; caule volubili, utrinque carinato. *Lin.*

* CONVOLVULUS (*havanensis*) foliis oblongis, nitidis; pedunculis unifloris. *Jacq.*

* CONVOLVULUS (*tuguriorum*) volubilis, foliis cordato-sagittatis, acutis; caule anguloso; ped. tetragonis, unifl. *Forst. prodr. 14.*

* LISERON (*céleſte*) volubile, à feuilles en cœur, très-acuminées, pubeſcentes; pédoncules alongés, à ombelle trifide.

* LISERON (*mucroné*) volubile, à feuilles palmées-pédiaires : à lobes ciliés, mucronés au ſommet; pédoncules uniflores.

* LISERON (*chevelu*) à feuilles en cœur, preſque glabres; têtes très-velues, colletées, à longs pédoncules; capſule liſſe. *Tige volubile.*

Explication des fig.

Pl. 104. f. 1. Fructification du Liſeron, *d'après Tournefort.* (*a*, *b*) Fleur entière. (*c*) Corolle ſéparée. (*d*) Piſtil. (*e*) Calice fructifère. (*f*) Capſule entière. (*g*, *h*) Capſule coupée. (*i*) Semences. (*l*) Liſeron *des haies.*

Pl. 104. f. 2. LISERON *jalap.*

297. QUAMOCLIT.

Carac. eſſent.

COR. infundibulif. ou campanulée. Stigm. en tête globuleuſe, ſubtrilobé. Capſ. 3-loculaire.

Carac. nat.

Cal. oblong, très-petit, quinquefide, perſiſtant.
Cor. monopétale, infundibuliforme ou campanulée. Limbe quinquefide, ouvert.
Etam. Cinq filamens, attachés à la baſe de la corolle. Anthères arrondies.
Piſt. Ovaire ſupérieur, arrondi. Style filiforme, de la longueur de la corolle. Stigmate en tête, globuleuſe, ſubtrilobé.
Péric. Capſule arrondie, triloculaire.
Sem. Pluſieurs, preſqu'ovales.

Tableau des eſpèces.

* *Feuilles pinnées, digitées ou palmées.*

2108. QUAMOCLIT *empenné.*
Q. à feuilles pinnées : pinnules très-menus; péd. longs, ſubbiflores; corolles infundibuliformes.

* CONVOLVULUS (*cæleſtis*) volubilis, foliis cordatis, acuminatiſſimis, pubeſcentibus; ped. elongatis, umbellato-trifidis. *Forſt. ibid.*

* CONVOLVULUS (*mucronatus*) volubilis, foliis palmato-pedatis; lobis ciliatis, apice mucronatis; pedunculis unifloris. *Forſt. ibid.*

* CONVOLVULUS (*crinitus*) foliis cordatis, ſubnudis; capitulis hirſutiſſimis, longè pedunc. involucratis; capſ. lævi. *Dict. p. 368.*

Explicatio iconum.

Tab. 104. f. 1. Fructificatio Convolvuli, *ex Tournefortio.* (*a*, *b*) Flos integer. (*c*) Corolla ſeparata. (*d*) Piſtillum. (*e*) Calyx fructifer. (*f*) Capſula integra. (*g*, *h*) Capſula diſſecta. (*i*) Semina. (*l*) Convolvulus *ſepium.*

Tab. 104. f. 2. CONVOLVULUS *jalapa.*

297. IPOMÆA.

Charact. eſſent.

COR. infundibulif. vel campanulata. Stigma capitato-globoſum, ſubtrilobum. Capſ. 3-locul.

Charact. nat.

Cal. obl. minimus, quinquefidus, perſiſtens.
Cor. monopetala, infundibuliformis vel campanulata. Limbus quinquefidus, patens.
Stam. Filamenta quinque, baſi corollæ inſerta. Antheræ ſubrotundæ.
Piſt. Germen ſuperum, ſubrotundum. Stylus filiformis, longitudine corollæ. Stigma capitato-globoſum, ſubtrilobum.
Peric. Capſula ſubrotunda, trilocularis.
Sem. Nonnulla, ſubovata.

Conſpectus ſpecierum.

* *Folia pinnata, digitata, vel palmata.*

2108. IPOMÆA *quamoclit.* T. 104. f. 1.
I. foliis pinnatis : pinnis tenuiſſimis; pedunculis longis, ſubbifloris; corollis infundibuliformibus.

L. n. l'Inde. ⊙ *Liseron empenné.* Dict. n°. 107. *Fleurs d'un rouge écarlate très-vif.*

2109. QUAMOCLIT *à ombelles.* Dict.
Q. à feuilles digitées, à sept folioles; péd. en ombelle, très-courts.
L. n. les pays chauds de l'Amérique.

2110. QUAMOCLIT *de Caroline.* Dict. N.
Q. à feuilles digitées: folioles pétiolées; péd. uniflores.
L. n. la Caroline.

2111. QUAMOCLIT *digité.* Dict.
Q. à feuilles palmées: à sept lobes lancéolés, obtus; pédoncules triflores.
L. n. les pays chauds de l'Amérique.

2112. QUAMOCLIT *tubéreux.* Dict.
Q. à feuilles palmées, à sept lobes lancéolés, pointus, très-entiers; pédonc. triflores.
L. n. la Jamaïque, &c. ♆ *Liane à tonelle.*

2113. QUAMOCLIT *du Sénégal.* Dict.
Q. à feuilles palmées: à cinq lobes, ovales, dont l'intermédiaire est le plus grand; pédonc. subtriflores.
L. n. le Sénégal. ♄ *Roussillon.*

2114. QUAMOCLIT *pied-de-tigre.* Dict.
Q. à feuilles palmées: à cinq ou sept lobes ovales; fleurs ramassées.
L. n. l'Inde. *Fl. en tête. Péd. hérissée de poils.*

** *Feuilles plus simples, entières, anguleuses ou trilobées.*

2115. QUAMOCLIT *écarlate.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, acuminées, anguleuses à la base; péd. multiflores.
L. n. Saint-Domingue. ⊙ *Cor. infundibulif. écarlate ou jaune-orangé.*

2116. QUAMOCLIT *anguleux.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, anguleuses, subtrilobées; pédoncules multiflores, plus longs que les feuilles.
L. n. l'isle de France. *Cor. infundib. écarlate.*

Ex India. ⊙ *Convolv. pennatus.* Dict. n°. 107. *C. species est, ut in Dict. Si stigma vere 2-lobum.*

2109. IPOMÆA *umbellata.*
I. foliis digitatis, septenis; pedunculis umbellatis, brevissimis.
Ex America calid. *Burm. Amer. t. 92. f. 2.*

2110. IPOMÆA *Caroliniana.*
I. foliis digitatis; foliolis petiolatis; pedunculis unifloris.
Ex Carolina, *Catesb. Car. 2. t. 19.*

2111. IPOMÆA *digitata.*
I. foliis palmatis: lobis septenis, lanceolatis, obtusis; pedunculis trifloris.
Ex Amer. calid. *Burm. amer. t. 92. f. 1.*

2112. IPOMÆA *tuberosa.*
I. foliis palmatis: lobis septenis, lanceolatis, acutis, integerrimis; pedunculis trifloris.
Ex Jamaica, &c. ♆ *Capsf. vesiculosa.*

2113. IPOMÆA *Senegalensis.*
I. foliis palmatis: lobis quinis, ovatis; intermedio majori; pedunculis subtrifloris.
E Senegal. ♄ *Caul. fruticul. tubercul. volub.*

2114. IPOMÆA *pes tigridis.*
I. foliis palmatis: lobis ovatis quinis septenisve; floribus aggregatis.
Ex India. *Rheed. 11. t. 59.*

** *Folia simpliciora, indivisa, angulosa, vel triloba.*

2115. IPOMÆA *coccinea.*
I. foliis cordatis, acuminatis, basi angulatis; pedunculis multifloris.
E Domingo. ⊙ *Commel. rar. t. 21. Ip. luteola. Jacq. ic. rar.*

2116. IPOMÆA *angulata.*
I. foliis cordatis, angulosis, subtrilobis; pedunculis multifloris, folio longioribus.
Ex insula Franciæ. *Sonnerat.*

2117. QUAMOCLIT *lacuneux*. Dict.
Q. à feuilles en cœur, acuminées, ſcrobiculées, anguleuſes à la baſe; péd. ſubuniflores, plus courts que les fleurs.
L. n. la Virginie, la Caroline. ⊙

2118. QUAMOCLIT *épineux*. Dict.
Q. à feuilles en cœur, pointues, ſubanguleuſes; tige garnie de piquans; cor. grandes, tubuleuſes.
L. n. la Jamaïque. ⊙

2119. QUAMOCLIT *glauque*. Dict.
Q. à feuilles ſagittées, tronquées poſtérieurement; péd. biflores.
L. n. le Mexique, dans les champs. *Pl. glabre.*

2120. QUAMOCLIT *batate*. Dict.
Q. à feuilles en cœur, haſtées, ſubanguleuſes; racine tubéreuſe; pédoncules multiflores.
(*a*) à tige, pétioles & pédoncules hiſpides. *Batate blanche.*
(*β*) à tige, pétioles & pédoncules glabres, d'un noir-pourpre. *La Batate rouge.*
L. n. l'Amér. cultivé dans les deux Indes. ♆ *Calices mucronés. Cor. blanchâtre en-dehors, & pourpre int.*

2121. QUAMOCLIT *haſté*. Dict.
Q. à feuilles ſagittées, haſtées; pédoncules biflores.
L. n. l'iſle de Java. *Fl. jaunes.*

2122. QUAMOCLIT *bicolor*. Dict.
Q. à feuilles en cœur, entières & trilobées; péd. ſubbiflores, plus courts que les feuilles; calices lancéolés.
L. n. le Cap de B. Eſpérance. *Cor. blanche en ſon int. bleue ou pourpr. en ſon limbe.*

2123. QUAMOCLIT *pubeſcent*. Dict.
Q. villeux-pubeſcent, à feuilles en cœur, rarement trilobées, très-molles; pédoncules uniflores; folioles calicinales, preſqu'en cœur.
L. n. l'Amérique. *Cor. purpurine.*

2124. QUAMOCLIT *hédéracé*. Dict.
Q. à feuilles en cœur, ſemi-trilobées; pédonc.

2117. IPOMÆA *lacunoſa*.
I. foliis cordatis, acuminatis, ſcrobiculatis, baſi angulatis; pedunculis ſubunifloris; flore brevioribus.
Ex Virginia, Carolina. ⊙

2118. IPOMÆA *bona nox*.
I. foliis cordatis, acutis, ſubangulatis; caule aculeato; corollis amplis tubuloſis.
Ex Jamaica. ⊙

2119. IPOMÆA *glaucifolia*.
I. foliis ſagittatis, poſtice truncatis; pedunculis biflori.
Ex Mexicæ arvis. *Dill. Elth. t. 87. f. 102.*

2120. IPOMÆA *batatas*.
I. foliis cordatis, haſtatis, ſubangulatis; radice tuberoſa; pedunculis multifloris.
(*a*) Caule petiolis pedunculiſque piloſo-hiſpidis.
(*β*) Caule petiolis pedunculiſque glabris, atropurpureis. *Convolv. batatas. Lin.* (*a*, *β*)
Ex America; culta in utriſque Indiis. ♆ *Calyces mucronati. Cor. extus albicans, intus purpurea.*

2121. IPOMÆA *haſtata*.
I. foliis ſagittato-haſtatis; pedunculis biflori. L.
Ex Java. *Burm. Fl. ind. t. 18. f. 2.*

2122. IPOMÆA *bicolor*.
I. foliis cordatis, integris trilobisque; pedunculis ſubbifloris, folio brevioribus; calycibus lanceolatis.
E Cap. Bonæ Spei. *Sonnerat. Cal. longus; laciniis lineari-lanceolatis.*

2123. IPOMÆA *pubeſcens*.
I. villoſo-pubeſcens; foliis cordatis, raro trilobis, molliſſimis; pedunculis unifloris; calycinis foliis ſubcordatis.
Ex America. *An aff. Convolv. tomentoſo?*

2124. IPOMÆA *hederacea*.
I. foliis cordatis, ſemi-trilobis; pedunculis

uniflores, plus courts que les pétioles; cal. barbus, hiſpides.

L. n. l'Amérique. ⊙ *Cor. violette ou bleuâtre.*

2125. QUAMOCLIT *feuilles de lierre.* Dict.
Q. à feuilles trilobées, en cœur; pédoncules multiflores en grappes.

L. n. l'Amér. *Péd. plus longs que les pétioles.*

2126. QUAMOCLIT *feuilles d'hépatique.* Dict.
Q. à feuilles trilobées (obtuſes); fleurs ramaſſées.

L. n. l'iſle de Céylan.

2127. QUAMOCLIT *feuilles de morelle.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, pointues, très-entières; fleurs ſolitaires.

L. n. l'Amérique.

2128. QUAMOCLIT *violet.*
Q. à feuilles en cœur, très-entières; fleurs rapprochées, corolles non diviſées.

L. n. l'Amérique. *A-t-il des rapports avec le ſuivant?*

2129. QUAMOCLIT *pourpre.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, entières; pédoncules multiflores; calice hiſpide à ſa baſe.

L. n. l'Amérique. ⊙ *Cor. d'un pourpre violet.*

2130. QUAMOCLIT *carné.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, glabres; pédoncules multiflores; corolles échancrées.

L. n. l'Amérique mérid. ♄

2131. QUAMOCLIT *paniculé.* Dict.
Q. à feuilles ovales acuminées, preſqu'en cœur à la baſe, très-glabres; péd. en cîme paniculée.

L. n. l'iſle de Java. *Voy. le Liſeron en cîme.*

2132. QUAMOCLIT *ſagitté.* Dict.
Q. à feuilles ſagittées, très-glabres; pédonc. uniflores.

L. n. la Barbarie. *Cor. pourpre.*

unifloris, petiolo brevioribus; calycibus barbato-hiſpidis.

Ex Amer. ⊙ *Jacq. Ic. rar. 1. An Conv. nil. L.*

2125. IPOMÆA *hederifolia.*
I. foliis trilobis, cordatis; pedunculis multifloris, racemoſis. L.

Ex America. *Burm. Amer. T. 93. f. 2.*

2126. IPOMÆA *hepaticifolia.*
I. foliis trilobis (obtuſis); floribus aggregatis.

Ex Zeylona. *Burm. fl. ind. t. 20. f. 2.*

2127. IPOMÆA *ſolanifolia.*
I. foliis cordatis, acutis, integerrimis; floribus ſolitariis.

Ex America. *Burm. Amer. t. 94. f. 2.*

2128. IPOMÆA *violacea.*
I. foliis cordatis, integerrimis; floribus confertis; corollis indiviſis. L.

Ex America. *Burm. Amer. t. 93. f. 1.*

2129. IPOMÆA *purpurea.*
I. foliis cordatis, integris; pedunculis multifloris; calyce baſi hiſpido.

Ex America. ⊙ *Convolv. purpureus. L.*

2130. IPOMÆA *carnea.*
I. foliis cordatis, glabris; pedunculis multifloris; corollis emarginatis.

Ex America merid. ♄ *Jacq. Amer. t. 18.*

2131. IPOMÆA *paniculata.*
I. foliis ovato-acuminatis, baſi ſubcordatis, glaberrimis; pedunculis cymoſo-paniculatis.

Ex Java. *Burm. Fl. ind. t. 21. f. 3.*

2132. IPOMÆA *ſagittata.* T. 104. f. 2.
I. foliis ſagittatis, glaberrimis; pedunculis uniflorus.

Ex Barbaria. *Poiret. Voy. en barb. 2. p. 122.*

2133. QUAMOCLIT *à grandes fleurs.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, très-entières, péd. subbiflores; tige & pétioles pubescens.
L. n. l'Inde. ♄ *Voy. Conv. grandifl. suppl. 136.*

2134. QUAMOCLIT *rampant.* Dict.
Q. à feuilles en cœur, nerveuses; pédoncules multiflores: tige rampante.
L. n. le Malabar. *Cor. blanche.*

2135. QUAMOCLIT *aquatique.* Dict.
Q. à feuilles en cœur lancéolées, subhastées, un peu dentées à la base; péd. biflores; tige rampante.
L. n. les Indes orientales. *C'est l'Ipomæa aquatica de Forskol.* (*Fl. p. 44. n°. 44.*)

Explication des fig.

Pl. 104. f. 1. QUAMOCLIT *empenné.* (*a*, *b*) Fleur entière. (*c*) Calice, pistil. (*d*) Pistil séparé. (*e*) Capsule entière. (*f*) Semences. (*g*) Portion de la tige, avec les feuilles & les fleurs.
Pl. 104. f. 2. QUAMOCLIT *sagitté.*

298. NICTAGE.

Caract. essent.

CAL. 5-fide. Cor. infundibulif. inférieure, resserrée au-dessus de l'ovaire. 1 sem. globuleuse, recouverte par la base de la corolle.

Caract. nat.

Cal. monophylle, inférieur, droit, ventru, quinquefide: à découp. ovales-lancéolées, pointues, inégales.
Cor. monopétale, infundibuliforme, inférieure, resserrée au-dessus de l'ovaire, à base persistante. Tube mince, long, plus épais supérieurement. Limbe ouvert, presqu'entier, obt. quinquefide, plissé.
Etam. Cinq filamens, nés du réceptacle, réunis à leur base en forme de glande à 5 dents, qui entoure l'ovaire, en partie adnés à la base du tube, filiforme, un peu inégaux, de la long. de la corolle. Anth. arrondies, didymes.
Pist. Ovaire supérieur, turbiné, enfermé dans la base resserrée du tube. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigmate globuleux, ponctué.

2133. IPOMÆA *grandiflora.*
I. foliis cordatis, integerrimis; pedunculis subbifloris; caule petiolisque pubescentibus.
Ex India. ♄ *Rheed. Mal. 11. t. 50.*

2134. IPOMÆA *repens.*
I. foliis cordatis, nervosis; pedunculis multifloris; caule repente.
Ex Malabaria. *Rheed. mal. XI. t. 58.*

2135. IPOMÆA *aquatica.*
I. foliis cordato-lanceolatis, subhastatis, basi subdentatis; pedunculis bifloris; caule repente.
Ex Indiis orient. *Rheed. Mal. XI. t. 52. Olus vagum. Rumph. 5. t. 155. f. 1?*

Explicatio iconum.

Tab. 104. f. 1. IPOMÆA *quamoclit.* (*a*, *b*) Flos integer. (*c*) Calyx, pistillum. (*d*) Pistillum separatum. (*e*) Capsula integra. (*f*) Semina. *Fig. ex Tournef.* (*g*) Pars caulis cum foliis & floribus.
Tab. 104. f. 2. IPOMÆA *sagittata.*

298. MIRABILIS.

Charact. essent.

CAL. 5-fidus. Cor. infundibulif. infera, supra germen coarctata. Sem. 1. globulosum, basi corollæ tectum.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, inferus, erecto-ventricosus, quinquefidus: laciniis ovato-lanceolatis, acutis, inæqualibus.
Cor. monopetala, infundibuliformis, infera, supra germen coarctata, basi persistente. Tubus tenuis, longus, supernè crassior. Limbus patens, subinteger, obtusè quinquefidus, plicatus.
Stam. Filamenta quinque, è receptaculo enata, basi coalita in glandulam 5-dentatam, germen ambientem, infimo tubo partim adnata, filiformia, subinæqualia, longitudine corollæ. Antheræ subrotundæ, didymæ.
Pist. Germen superum, turbinatum, basi tubi coarctata inclusum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma globulosum, punctatum.

Péric. Aucun.

Sem. Une seule, ovale-pentagone, recouverte par la base endurcie de la corolle.

Tableau des espèces.

2136. NICTAGE *du Pérou.* Dict.
N. à fleurs ramassées, terminales, droites.
L. n. le Pérou. ♆ *La belle de nuit.*

2137. NICTAGE *dichotome.* Dict.
N. à fleurs sessiles, axillaires, solitaires, droites.
L. n. le Mexique. ♆

2138. NICTAGE *à longues fleurs.* Dict.
N. à fleurs ramassées, très-longues, un peu penchées, terminales; feuilles lég. villeuses.
L. n. le Mexique. ♆ *Fl. blanches, velues.*

2139. NICTAGE *visqueuse.* Dict.
N. villeuse, glutineuse; à feuilles en cœur, orbiculées, pointues; fl. en grappes; calice fructifère grandi, plane.
L. n. le Pérou. ♆ *Fl. petites, 3 ou 4 étam.*

Explication des fig.

Pl. 105. NICTAGE *du Pérou.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle ouverte. (*c*) Semence couverte. (*d*) Ecorce de la semence coupée dans sa longueur. (*e*) Semence séparée. (*f*) Sommité d'un rameau fleuri.

299. ABRONE.

Caract. essent.

CAL. O. Cor. inférieure, hypocratérif. resserrée au-dessus de l'ovaire. 1 sem. à 5 angles, recouverte par la base endurcie de la corolle.

Caract. nat.

Cal. collerette pentaphylle, très-courte: à folioles ovales, pointues.
Propre aucun.

Cor. monopétale, hypocratérif. Tube cylindr. resserré à sa base au-dessus de l'ovaire. Limbe ouvert, plus court que le tube, quinquefide: à découp. échancrées en cœur.

Peric. Nullum.

Sem. unicum, ovato-pentagonum, basi indurata corollæ tectum.

Conspectus specierum.

2136. MIRABILIS *Jalapa.* T. 105.
M. floribus congestis terminalibus, erectis. L.
E Peru. ♆ *Florum colore variat.*

2137. MIRABILIS *dichotoma.*
M. floribus sessilibus, axillaribus, solitariis, erectis.
E Mexico. ♆

2138. MIRABILIS *longiflora.*
M. floribus congestis, longissimis, subnutantibus, terminalibus; foliis subvillosis.
E Mexico. ♆ *Fl. noctu fragrantissimi.*

2139. MIRABILIS *viscosa.*
M. villoso-glutinosa; foliis cordatis, orbiculato-acutis; floribus racemosis; calyce fructifero ampliato plano.
E Peru. ♆ *Cavan. Ic. pl. p. 13. t. 19.*

Explicatio iconum.

Tab. 105. MIRABILIS *Jalapa.* (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla aperta. (*c*) Semen tectum. (*d*) Crusta seminis longitudinaliter secta. (*e*) Semen solutum. *Fig. ex Tournef.* (*f*) Summitas ramuli floridi.

299. ABRONIA.

Charact. essent.

CAL. O. Cor. infera, hypocrateriformis, supra germen coarctata. Sem. 1. 5-angulare, cor. basi indurata tectum.

Charact. nat.

Cal. Involucrum pentaphyllum, brevissimum: foliolis ovato acutis.
Proprius nullus.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindraceus, basi supra germen coarctatus. Limbus patens, tubo brevior, quinquefidus: laciniis cordato-emarginatis.

Etam. Cinq filamens, inégaux : deux dans la base de la corolle ; trois vers le sommet du tube. Anthères oblongues, non saillantes.

Pist. Ovaire supérieur, oblong, enfermée dans la base resserrée du tube. Style filiforme, presqu'aussi long que le tube. Stigmate simple.

Péric. Aucun.

Sem. Une seule, dure, recouv par la base de la corolle, ovale-pointue, quinqu'angulaire ; à angles ondulés, crépus.

Tableau des espèces.

2140. ABRONE *à ombelles.* Dict. suppl. *L. n.* les bords marit. de la Californie. *Colignon. Fl. en tête ombelliforme.*

Explication des fig.

Tab. 105. ABRONE *à ombelles.* (*a*) Partie supérieure de la tige. (*b*) Fleurs comme en ombelle. (*c*) Fruits ramassés en faisceau. (*d*) Fruit entier séparé. (*e*) Le même coupé transversalement.

300. DENTELAIRE.

Caract. essent.

CAL. tubuleux, scabre par des poils glanduleux. Cor. infundib. Stigm. 5-fide. Capsl. 1-sperme, env. par le calice.

Caract. nat.

Cal. monophylle, ovale-oblong, tubulé, pentagone, scabre par des poils glanduleux, persistant, à bord divisé en cinq dents.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindracé, plus long que le calice. Limbe quinquefide, demi-ouvert : à découp. ovales.

Etam. Cinq filamens, subulés, enfermés dans le tube, dilatés à leur base, en écailles qui entourent l'ovaire. Anthères oblongues.

Pist. Ovaire supérieur, ovale, très-petit. Style simple, de la longueur du tube. Stigmate quinquefide.

Péric. Capsule ovale-oblongue, subpentagone, mucronée par le style pers. uniloculaire, à cinq valves.

Stam. Filamenta quinque, inæqualia : duo in imo corollæ : tria versus apicem tubi. Antheræ oblongæ, inclusæ.

Pist. Germen superum, oblongum, basi tubi coarctata inclusum. Stylus filiformis, ferè longitudine tubi. Stigma simplex.

Peric. Nullum.

Sem. unicum, durum, basi corollæ tectum, ovato-acutum, quinquangulare ; angulis undulato crispis.

Conspectus specierum.

2140. ABRONIA *umbellata.* T. 105. Ex Californiæ maritimis. *Abronia. Juss. gen. Flores capitato-umbellati.*

Explicatio iconum.

Tab. 105. ABRONIA *umbellata.* (*a*) Pars superior caulis. (*b*) Flores subumbellati. (*c*) Fructus glomerato-fasciculati. (*d*) Fructus integer segregatus. (*e*) Idem transversim sectus.

300. PLUMBAGO.

Charact. essent.

CAL. tubulosus, pilis glandulosis scaber. Cor. infundibuliformis. Stigm. 5-fidum. Capsl. 1-sperma ; calyce vestita.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, ovato-oblongus, tubulatus, pentagonus, pilis glandulosis scaber, persistens : ore quinquedentato.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, calyce longior. Limbus quinquefidus, erecto-patens : laciniis ovatis.

Stam. Filamenta quinque, subulata, tubo inclusa, basi dilatata in squamulas germen ambientes. Antheræ oblongæ.

Pist. Germen superum, ovatum, minimum. Stylus simplex, longitudine tubi. Stigma quinquefidum.

Peric. Capsula ovato-oblonga, subpentagona, stylo persistente mucronata, uniloculari, quinquevalvis.

Sem. Une seule, oblongue, pendante à un cordon ombilical.

Tableau des espèces.

2141. DENTELAIRE *européenne*. Dict. n°. 1.
D. à feuilles amplexicaules, lancéol. scabres.
L. n. l'Europe australe. ♃

2142. DENTELAIRE *sarmenteuse*.
D. à feuilles pétiolées, ovales, glabres; tige en zig-zag, sarmenteuse, presque grimpante.
L. n. les deux Indes. ♄ *Dentelaire n°. 2 & n°. 3. Dict. 2. p. 269. Fl. blanches.*

2143. DENTELAIRE *à fl. roses*. Dict. n°. 4.
D. à feuilles pétiolées, ovales, glabres, subdenticulées; tige à articulations gibbeuses.
L. n. les Indes orient. ♄

2144. DENTELAIRE *auriculée*. Dict. n°. 5.
D. à feuilles ovales-oblongues, pétiolées, écailleuses & ponctuées en-dessous; pétioles à oreillettes amplexicaules.
L. n. les Indes orientales. ♄

Explication des fig.

Pl. 105. DENTELAIRE *européenne*. (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle séparée. (*c*, *d*) Calice, pistil. (*e*, *f*) Calice fructifère. (*g*) Capsule séparée. (*H*) Sommité d'un rameau. (*h*, *i*) Capsule env. par le calice. (*k*) Capsule avant sa maturité. (*l*) La même coupée. (*m*) Capsule dans sa maturité. (*n*) La même ouverte. (*o*) Semence séparée.

301. VEIGÈLE.

Caract. essent.

CAL. 5-phylle. Cor. infundibuliforme. Style sortant de la base de l'ovaire. Stigm. pelté.

Caract. nat.

Cal. pentaphylle: à découpures subulées, droites, égales.
Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube de la longueur du calice, velu intérieurement. Limbe campanulé, semiquinquefide: à découp. ovales, obtuses, demi-ouvertes.

Sem. Unicum, oblongum; funiculo umbilicali pendulum. *Gærtn.*

Conspectus specierum.

2141. PLUMBAGO *europæa*. T. 105.
P. foliis amplexicaulibus, lanceolatis, scabris.
Ex Europa australi. ♃

2142. PLUMBAGO *sarmentosa*.
P. foliis petiolatis, ovatis, glabris; caule flexuoso, sarmentoso, subscandente.
Ex utriusque Indiis. ♄ *Pl. scandens. L. pl. Zeylanica ejusd. Fl. albi.*

2143. PLUMBAGO *rosea*.
P. foliis petiolatis, ovatis, glabris, subdenticulatis; caule geniculis gibbosis.
Ex Indiis orientalibus. ♄

2144. PLUMBAGO *auriculata*.
P. foliis ovato-oblongis, petiolatis, subtus squamoso-punctatis: petiolis auriculis caulem amplexantibus.
Ex Indiis orientalibus. ♄

Explicatio iconum.

Tab. 105. PLUMBAGO *europæa*. (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla separata. (*c*, *d*) Calyx, pistillum. (*e*, *f*) Calyx fructifer. (*g*) Capsula separata. *Fig. ex Tournef.* (*H*) Ramuli summitas. (*h*, *i*) Capsula calyce vestita. (*k*) Capsula immatura. (*l*) Eadem secta. (*m*) Capsula matura. (*n*) Eadem dehiscens. (*o*) Semen separatum. *Fig. ex Gærtn.*

301. WEIGELA.

Charact. essent.

CAL. 5-phyllus. Cor. infundibuliformis. Stylus è basi germinis. Stigm. peltatum.

Charact. nat.

Cal. pentaphyllus: laciniis subulatis, erectis, æqualibus.
Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus longitudine calycis, internè villosus. Limbus campanulatus, semiquinquefidus: laciniis ovatis, obtusis, erecto-patentibus.

Etam. Cinq filamens, filiformes, inſérés au tube, droits, preſque de la longueur de la corolle. Anthères droites, linéaires, bifides à la baſe, obtuſes au ſommet.

Piſt. Ovaire ſupérieur, tétragone, tronqué, glabre; ſtyle ſortant de la baſe de l'ovaire, filiforme, un peu plus long que la corolle. Stigm. pelté, plane.

Péric. . . . . . .

Sem. nue?

Tableau des eſpèces.

2145. VEIGÈLE *du Japon.* Dict.
L. n. le Japon. ♄ *Arbriſſ. à f. opp. Fleurs purpurines.*

302. POLÉMOINE.

Caract. eſſent.

Cor. 1-pétale, en roue. Etamines à filamens dilatés à leur baſe. Capſ. 3-loculaire. Sem. anguleuſes.

Caract. nat.

Cal. monophylle, ſemiquinquefide, inférieur, cyathiforme, pointu, perſiſtant.

Cor. monopétale, en roue. Tube plus court que le calice, fermé par les valvules des étamines. Limbe ample, plane, quinquefide: à découp. arrondies, obtuſes.

Etam. Cinq filamens, filiformes, plus courts que la corolle, inclinés, dilatés à leur baſe en valvules attachées au ſommet du tube. Anthères arrondies.

Piſt. Ovaire ſupérieur, ovale, pointu. Style filiforme, de la longueur de la corolle. Stigm. trifide.

Péric. Capſule ovale, trigone, triloculaire, trivalve, env. par le calice.

Sem. Pluſieurs, irrégulières, anguleuſes.

Tableau des eſpèces.

2146. POLÉMOINE *bleue.* Dict.
P. à feuilles pinnées; fleurs droites; calices plus longs que le tube de la corolle.

Stam. Filamenta quinque, tubo inſerta, filiformia, erecta, longitudine fere corollæ. Antheræ erectæ, lineares, baſi bifidæ, apice obtuſæ.

Piſt. Germen ſuperum, tetragonum, truncatum, glabrum. Stylus è baſi germinis, filiformis, corolla paulo longior. Stigma peltatum, planum.

Péric. . . . . . .

Sem. nudum?

Conſpectus ſpecierum.

2145. WEIGELA *Japonica.* T. 105.
Ex Japonia. ♄ *Thunb. Nov. gen. 5. Fl. Jap. p. 90.*

302. POLEMONIUM.

Charact. eſſent.

Cor. 1-petala, rotata. Stamina filamentis baſi dilatatis. Capſ. 3-locularis. Sem. angulata.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, ſemiquinquefidus, inferus, cyathiformis, acutus, perſiſtens.

Cor. monopetala, rotata. Tubus calyce brevior, valvulis ſtaminum clauſus: limbus amplus, planus, quinquefidus: laciniis ſubrotundis, obtuſis.

Stam. Filamenta quinque, filiformia, corollæ breviora, inclinata, baſi dilatata in valvulas apici tubi inſertas. Antheræ ſubrotundæ.

Piſt. Germen ſuperum, ovatum, acutum. Stylus filiformis, longitudine corollæ. Stigma trifidum.

Peric. Capſula ovata, trigona, trilocularis, trivalvis, calyce veſtita.

Sem. Plura, irregularia, angulata.

Conſpectus ſpecierum.

2146. POLEMONIUM *cæruleum.* T. 106. f. 1.
P. foliis pinnatis; floribus erectis; calycibus tubo corollæ longioribus.

L. n. l'Angleterre, la Suiſſe, &c. ♆ *Valériane grecque.*

β. Elle varie à fl. blanches.

2147. POLEMOINE *rampante.* Dict.
P. à feuilles pinnées, à ſept folioles; fleurs terminales : penchées.
L. n. la Virginie. ♆ *Racine rampante.*

2148. POLEMOINE *douteuſe.* Dict.
P. à feuilles inférieures haſtées; les ſupérieures lancéolées.
L. n. la Virginie. *Style ſemi-biſide.*

* *Le Polemonium roelloides, & le Polemonium campanuloides (de Linné fils, ſuppl. 139.), s'écartent des vrais Polémoines par leur ovaire inférieur.*

Explication des fig.

Pl. 106. f. 1. POLEMOINE *bleue.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle vue en-deſſus. (*c*, *d*) Calice, piſtil. (*e*) Capſule entière. (*f*) Capſule env. par le calice. (*g*) La même nue & ouverte (*h*) La même coupée tranſverſalement. (*i*) Situation des ſemences. (*l*, *m*, *n*) Semences ſéparées & coupées. (*o*) Embryon ſéparé. (*p*) Partie ſupérieure de la tige. (*q*) Feuille radicale.
Pl. 106. f. 2. POLEMOINE *rampante.*

303. CANTU.

Caract. eſſent.

COR. 1-pétale, infundibuliforme. Etam. à filam. égaux. Capſ. 3-loculaire; ſem. ailées.

Caract. nat.

Cal. monophylle, tubuleux; un peu court, perſiſtant, quinquefide : à découpures ovales-pointues, preſqu'égales.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindrique, plus long que le calice. Limbe preſque régulier, demi-ouvert, à cinq lobes courts & obtus.

Etam. Cinq filamens, égaux, attachés au tube de la corolle. Anthères ovales, petites, vacillantes.

Ex Anglia, Helvetia, &c. ♆ *Gærtn. p. 299. t. 62.*
β. Variat flore albo.

2147. POLEMONIUM *reptans.* T. 106. f. 2.
P. foliis pinnatis, ſeptenis; floribus terminalibus, nutantibus.
Ex Virginia. ♆ *Radix repens.*

2148. POLEMONIUM *dubium.*
P. foliis inferioribus haſtatis; ſuperioribus lanceolatis.
Ex Virginia. *Stylus ſemi-biſidus.* L.

* *Polemonium roelloides, & Polemonium campanuloides (Linn. fil. ſuppl. 139.), à Polemoniis veris germine infero recedunt.*

Explicatio iconum.

Tab. 106. f. 1. POLEMONIUM *caruleum.* (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla ſupernè viſa. (*c*, *d*) Calyx, piſtillum. (*e*) Capſula integra. *Fig. ex Tourneſ.* (*f*) Capſula calyce veſtita. (*g*) Eadem nuda dehiſcens. (*h*) Ejus ſectio tranſverſalis. (*i*) Seminum ſitus. (*l*, *m*, *n*) Semina ſeparata & diſſecta. (*o*) Embryo ſeparatus. *Fig. ex Gærtn.* (*p*) Pars ſuperior caulis. (*q*) Fol. radicale.
Tab. 106. f. 2. POLEMONIUM *reptans.*

303. CANTUA.

Charact. eſſent.

COR. 1-petala, infundibuliformis. Stam. filamentis æqualibus. Capſ. 3-locul. Sem. alata.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, tubuloſus, breviuſculus, perſiſtens, quinquefidus : laciniis ovato-acutis ſubæqualibus.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindricus, calyce longior. Limbus ſubæqualis, erecto-patens, quinquelobus : lobis brevibus obtuſis.

Stam. Filamenta quinque, æqualia, tubo corollæ inſerta. Antheræ ovatæ, parvæ, verſatiles.

Piſt.

Pist. Ovaire supérieur, ovale oblong. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigmate trifide.

Péric. Capsule ovale-oblongue, env. à sa base par le calice, triloculaire, trivalve, s'ouvrant par le som. à valves septifères dans leur milieu.

Sem. Plusieurs, ovales, ailées, attachées à un placenta central & triangulaire.

Tableau des espèces.

2149. CANTU *à feuilles de buis.* Dict. n°. 1.
C. à feuilles ovales-lancéolées, presque sessiles, pubescentes en-dessous; fleur tubuleuse; étamines incluses.
L. n. le Pérou. ♄ *Feuilles petites.*

2150. CANTU *à f. de poirier.* Dict. n°. 2.
C. à feuilles ovales, pétiolées, glabres; fleur presque campanulée; étamines saillantes.
L. n. le Pérou. ♄ *Cal. souvent 3-fide.*

2151. CANTU *pinnatifide.* Dict. suppl.
C. à feuilles pinnatifides, linéaires; fleurs en grappe, penchées.
L. n. la Caroline. ♄ *Voyez le Genera de M. de Jussieu, p. 136.*

Explication des fig.

Pl. 106. f. 1. CANTU *à f. de poirier.* (*a*) Sommité d'un rameau. (*b*) Fleurs entières. (*c*) Corolle ouverte. (*d*) Calice, pistil. (*e*) Capsule entière. (*f*) La même ouverte. (*g*) Semence séparée.
Pl. 106. f. 2. CANTU *à f. de buis.* (*a*, *b*) Sommité d'un rameau avec ses fleurs. (*c*) Corolle ouverte. (*d*) Calice, pistil. (*e*) Capsule entière, env. par le cal. (*f*) La même ouverte. (*g*) Semence. *Représentée d'après un dessin non publié, communiqué par M. de Jussieu.*

304. SPIGELE.

Caract. essent.

COR. infundibuliforme. Stigm. simple. Capsule didyme, 2-loculaire, polysperme.

Caract. nat.

Cal. petit, persistant, partagé en cinq, à découpures pointues.

Pist. Germen superum, ovato-oblongum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma trifidum.

Peric. Capsula ovato-oblonga, basi calyce vestita, trilocularis, trivalvis, apice dehiscens: valvis medio septiferis.

Sem. Plura, ovata, alata, receptaculo centrali triangulari affixa.

Conspectus specierum.

2149. CANTUA *buxifolia.* T. 106. f. 2.
C. foliis ovato-lanceolatis, sessilibus, subtus pubescentibus; flore tubuloso; staminibus inclusis.
E Peru. ♄ *Jos. Juss.*

2150. CANTUA *pyrifolia.* T. 106. f. 1.
C. foliis ovatis, petiolatis, glabris; flore subcampanulato; staminibus exsertis.
E Peru. ♄ *Jos. Juss.*

2151. CANTUA *pinnatifida.*
C. foliis pinnatifidis, linearibus; floribus racemosis, cernuis.
Ex Carolina. ♄ *Ipomœa rubra. Linn. Dill. Eltham. p. 321. t. 241.*

Explicatio iconum.

Tab. 106. f. 1. CANTUA *pyrifolia.* (*a*) Summitas ramuli. (*b*) Flores integri. (*c*) Corolla aperta. (*d*) Calyx, pistillum. (*e*) Capsula integra. (*f*) Eadem dehiscens (*g*) Semen separatum.
Tab. 106. f. 2. CANTUA *buxifolia.* (*a*, *b*) Summitas ramuli cum floribus. (*c*) Corolla aperta. (*d*) Calyx, pistillum. (*e*) Capsula integra, calyce vestita. (*f*) Eadem dehiscens. (*g*) Semen. *Fig. ex icone inedita, communicata à D. de Jussieu.*

304. SPIGELIA.

Charact. essent.

COR. infundibuliformis. Stigma simplex. Capsula didyma, 2-locularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. parvus, persistens, quinquepartitus: laciniis acutis.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube beaucoup plus long que le calice, rétréci inférieurement. Limbe ouvert, 5-fide : à déc. acum.

Etam. Cinq filamens, plus courts que la corolle, attachés à ſon tube. Anthères ſagittées.

Piſt. Ovaire ſupérieur, didyme. Style ſubulé. Stigmate ſimple.

Péric. Capſule didyme, biloculaire, quadrivalve.

Sem. nombreuſes, très-petites, anguleuſes (attachées à l'angle intérieur des loges).

Tableau des eſpèces.

2152. SPIGÈLE *fruticuleuſe*. Dict.
S. à tige fruticuleuſe; feuilles ovales-pétiolées: celles du ſommet quaternées.
L. n. Cayenne. ♄ *Comm. par M. Richard.*

2153. SPIGÈLE *anthelminthique*. Dict.
S. à tige herbacée, feuilles lancéolées, ſeſſiles: celles du ſommet quaternées, plus grandes.
L. n. l'Amérique mérid. ⊙

2154. SPIGÈLE *du Mariland*. Dict.
S. à tige herbacée, tétragone; feuilles ſeſſiles, toutes oppoſées.
L. n. l'Amérique ſeptentr. ♃ *Fl. écarlates en-dehors.*

Explication des figures.

Pl. 107. SPIGELE *anthelmintique*. (*a*) Fleur ſéparée. (*b*) Corolle entière. (*c*) La même ouverte. (*d*) Calice. (*e*, *f*, *g*) Fruit. (*h*) Partie ſupérieure de la tige avec l'épi.

305. OPHIORIZE.

Caract. eſſent.

COR. infundibuliforme. 2 ſtigmates. Capſule 2-lobée, 2-loculaire, polyſperme.

Caract. nat.

Cal. monophylle, urcéolé, droit, à cinq dents, régulier, perſiſtant.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube plus long que le calice. Orifice velu. Limbe quinquefide: à découp. ovales-pointues.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus calyce multo longior, infernè anguſtatus. Limbus patens, quinquefidus: laciniis acuminatis.

Stam. Filamenta quinque, corolla breviora, tubo inſerta. Antheræ ſagittatæ.

Piſt. Germen ſuperum, didymum. Stylus ſubulatus. Stigma ſimplex.

Peric. Capſula didyma, bilocularis, quadrivalvis.

Sem. Plurima, minima, angulata (angulo interiori loculorum affixa. *Juſſ.*)

Conſpectus ſpecierum.

2152. SPIGELIA *fruticuloſa*.
S. caule fruticuloſo; foliis ovatis, petiolatis; ſummis quaternis.
Ex Cayenna. ♄ *Caulis erectus ſeſquipedalis.*

2153. SPIGELIA *anthelmia*. T. 107.
S. caule herbaceo, foliis lanceolatis, ſeſſilibus: ſummis quaternis, majoribus.
Ex America merid. ⊙

2154. SPIGELIA *Marylandica*.
S. caule herbaceo, tetragono; foliis ſeſſilibus, omnibus oppoſitis.
Ex Amer. ſeptentr. ♃ *Fl. extùs coccinei.*

Explication iconum.

Tab. 107. SPIGELIA *anthelmia*. (*a*) Flos ſeparatus. (*b*) Corolla integra. (*c*) Eadem aperta. (*d*) Calyx. (*e*, *f*, *g*) Fructus. (*h*) Pars ſuperior caulis cum ſpica. *Fig. ex Linn. Amœn. acad.*

305. OPHIORRHIZA.

Charact. eſſent.

COR. infundibuliformis. Stigmata 2. Capſula 2-loba, 2-locularis, polyſperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, erectus, urceolatus, quinquedentatus, æqualis, perſiſtens.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus calyce longior. Faux villoſa. Limbus quinquefidus: laciniis ovato-acutis.

Etam. Cinq filamens, filiformes, très-courts, attachés au tube. Anth. ovales, conniventes.

Pist. Ovaire supérieur, bifide. Style bifide au sommet ou deux styles. Stigmates obtus.

Péric. Capsule bilobée, large, un peu obtuse, biloculaire : à lobes divergens, s'ouvrant par leur côté intérieur.

Sem. nombreuses, anguleuses, attachées à deux placenta alongés.

Tableau des espèces.

2155. OPHIORIZE *mitréole.* Dict.
O. à feuilles ovales; lobes des capsules droits, pointus.
L. n. l'Amérique mérid. ⊙ *Épis grêles, lâches, unilatéraux. Fleurs blanches, digynes.*

2156. OPHIORIZE *de l'Inde.* Dict.
O. à feuilles lancéolées-ovales; lobes des capsules divergens, obtus.
L. n. l'Inde. ♆ *Épis en corymbe terminal.*

* OPHIORIZE (*à ombelles*) à tige ligneuse; feuilles lancéolées, pointues; ombelles axillaires, trifides. *L. n. L'isle d'Otahiti.*

Explication des fig.

Pl. 107. f. 1. OPHIORIZE *mitréole.* (*a*) Fleur entière. (*b*, *c*) Corolle vue de côté & en dessus. (*d*) Calice fructifere. (*e*) Partie supérieure de la tige.
Pl. 107. f. 2. OPHIORIZE *de l'Inde.* (*a*) Deux épis chargés de capsules sessiles. (*b*) Capsule fermée. (*c*) La même ouverte. (*d*) La même coupée, montrant les réceptacles des semences. (*e*) Semences séparées. (*f*, *g*) Les mêmes diversement coupées.

306. LISIANTHE.

Caract. essent.

COR. infundibuliforme : à tube un peu ventru. Stigm. à 2 lames. Capf. 2-loculaire, 2-valve : à bords des valves roulés en-dedans.

Caract. nat.

Cal. partagé en cinq, droit, persistant : à découpures subcarinées, membran. sur les bords.

Stam. Filamenta quinque, filiformia, brevissima, tubo inserta. Antheræ ovatæ, conniventes.

Pist. Germen superum, bifidum. Stylus apice bifidus, vel styli duo. Stigmata obtusa.

Peric. Capsula biloba, lata, obtusiuscula, bilocularis : lobis divaricatis, latere interiori dehiscentibus.

Sem. numerosa, angulata, receptaculis duobus elongatis inserta.

Conspectus specierum.

2155. OPHIORRHIZA *mitreola.* T. 107. f. 1.
O. foliis ovatis; capsularum lobis, erectis, acutis.
Ex America merid. ⊙ *Swartz. obs. t. 3. f. 2. (Non fig. 1.). Flores albi, digyni.*

2156. OPHIORRHIZA *mungos.* T. 107. f. 2.
O. foliis lanceolato-ovatis; capsularum lobis divaricatis, obtusis.
Ex India. ♆ *Plenck. Ic. t. 90. Gærtn. t. 55.*

* OPHIORRHIZA (*subumbellata*) caule fruticoso; foliis lanceolatis, acutis; umbellis axillaribus, trifidis. *Forst. Fl. austr. n°. 66.*

Explicatio iconum.

Tab. 107. f. 1. OPHIORRHIZA *mitreola.* (*a*) Flos integer. (*b*, *c*) Corolla à latere supraque spectata. (*d*) Calyx fructifer. (*e*) Pars superior caulis. *Ex Sicco.*
Tab. 107. f. 2. OPHIORRHIZA *mungos.* (*a*) Spicæ duæ, capsulis sessilibus onustæ. (*b*) Capsula clausa. (*c*) Eadem dehiscens. (*d*) Eadem dissecta, receptacula seminum exhibens. (*e*) Semina separata. (*f*, *g*) Eadem variè secta. *Fig. ex Gærtn.*

306. LISIANTHUS.

Charact. essent.

COR. infundibuliformis : tubo subventricoso. Stigm. 2-lamellatum. Capf. 2-locularis, 2-valvis : valvularum marginibus involutis.

Charact. nat.

Cal. quinquepartitus, erectus, persistens : laciniis subcarinatis, margine membranaceis.

Cor. monopétale, infundibuliforme, beaucoup plus longue que le calice. Tube long, un peu ventru, quelquefois courbé, rétréci à sa base dans le calice. Limbe part. en cinq déc. ovales-lancéolées, ouv. ou recourbées.

Etam. Cinq filamens, filiformes, plus longs que le tube. Anthères ovales, inclinées.

Pist. Ovaire supérieur, oblong, acuminé. Style filiforme, persistant, de la longueur des étamines. Stigmate en tête, à deux lobes ou à deux lames.

Péric. Capsule ovale, oblongue, acuminée, biloculaire, bivalve: à bords des valves roulés en-dedans.

Sem. nombreuses.

Tableau des espèces.

2157. LISIANTHE *cariné*. Dict. n°. 1.
L. à feuilles sessiles, ovales, trinerves; folioles calicinales, ailées par une carène élargie supérieurement; fleur longue.
L. n. l'Isle de Madagascar. ♄ *Pl. glabre.*

2158. LISIANTHE *trinerve*. Dict. n°. 2.
L. pubescent, à feuilles ovales, mucronées, trinerves; fleurs en panicule lâche, terminale.
L. n. l'Isle de Madagascar.

2159. LISIANTHE *à longues f.* Dict. n°. 3.
L. rameux, à feuilles oblongues, pointues; découpures de la corolle ovales-lancéolées, ouvertes.
L. n. la Jamaïque. ♄ ?

2160. LISIANTHE *à f. en cœur*. Dict. n°. 4.
L. dichotome, à feuilles en cœur, pétiolées; fleurs subgeminées, terminales.
L. n. la Jamaïque.

2161. LISIANTHE *campanulacé*. Dict. n°. 5.
L. à feuilles ovales, pointues, pétiolées; fleurs terminales, un peu irrégulières.
L. n. les pays chauds de l'Amérique. *Richard.*

2162. LISIANTHE *à petites f.* Dict. n°. 6.
L. à tige subfiliforme; feuilles linéaires, droites, très-petites; corymbe terminal, pauciflore.
L. n. les pays chauds de l'Amérique. *Richard.*

Cor. monopetala, infundibuliformis, calyce multo longior. Tubus longus, subventricosus, interdum curvatus, basi intra calycem coarctatus. Limbus quinquepartitus: laciniis ovato-lanceolatis, patentibus aut recurvis.

Stam. Filamenta quinque, tubo longiora, filiformia. Antheræ ovatæ, incumbentes.

Pist. Germen superum, oblongum, acuminatum. Stylus filiformis, persistens, longitudine staminum. Stigma capitatum, bilobum vel bilamellatum.

Péric. Capsula ovato-oblonga, acuminata, biloculatis, bivalvis: valvularum marginibus intortis.

Sem. numerosa.

Conspectus specierum.

2157. LISIANTHUS *carinatus*. T. 107. f. 3.
L. foliis sessilibus, ovatis, trinerviis; foliolis calycinis, carina sursum ampliata alatis, longo flore.
Ex inf. Madagascariæ. ♄

2158. LISIANTHUS *trinervis*.
L. pubescens, foliis ovatis, mucronatis, trinervibus; floribus laxè panic terminalibus.
Ex inf. Madagascariæ. *Commers.*

2159. LISIANTHUS *longifolius*.
L. ramosus, foliis oblongis, acutis; corollarum laciniis ovato-lanceolatis, patentibus.
Ex Jamaica. ♄ ? *Brown. Jam. t. 9. f. 1.*

2160. LISIANTHUS *cordifolius*.
L. dichotomus, foliis cordatis, petiolatis; floribus terminalibus, subgeminis.
Ex Jamaica. *Brown. Jam. t. 9. f. 2.*

2161. LISIANTHUS *campanulaceus*.
L. foliis ovatis, acutis, petiolatis; floribus terminalibus, subinæqualibus.
Ex America calidiore. *Limbi laciniæ obtusæ.*

2162. LISIANTHUS *parvifolius*.
L. caule subfiliformi; foliis linearibus, minutis, erectis; corymbo terminali, pauciflore.
Ex America calid. *Caulis simplex, erectus.*

2163. LISIANTHE *acuminée*. Dict. n°. 7.
L. fruteſcent, à feuilles ovales, acuminées; corolle preſque campanulée: à lobes courts arrondis.
L. n. la Guadeloupe. ♄ *Fl. grandes.*

2164. LISIANTHE *à f. glauques*. Dict. n°. 8.
L. à feuilles ſeſſiles, ovales-oblongues; pédoncules alongés, uniflores; découpures de la corolle plus longues que le tube.
L. n.... Pl. glabre. Fl. d'un pourpre violet. ♆

2165. LISIANTHE *purpurine*. Dict. n°. 9.
L. à feuilles ſeſſiles, ovales, pointues; corolle penchée, courbée: à découpures réfléchies.
L. n. la Guiane. ⊙

2166. LISIANTHE *ailée*. Dict. n°. 10.
L. à feuilles ovales-lancéolées, preſque ſeſſiles; tige tétragone; à angles membraneux; panicule dichotome; fleurs blanchâtres.
L. n. la Guiane. ⊙ *Cor. courbée.*

2167. LISIANTHE *glabre*. Dict. ſuppl.
L. glabre, à feuilles ovales, pétiolées; corymbes terminaux.
L. n. l'Amérique mérid. *Tige cylindrique; cor. jaune, étam. égales.*

2168. LISIANTHE *chenoloïde*. Dict. ſuppl.
L. à feuilles elliptiques-oblongues, ſubconnées; tige cylindrique, panic. à grappes; fleurs jaunes.
L. n. Surinam. *F. un peu tomenteuſes.*

2169. LISIANTHE *à grandes fl.* Dict. n°. 11.
L. à feuilles connées, ovales acuminées; lobes de la corolle arrondis, comme ſinués; étam. inégales.
L. n. la Guiane. ⊙ *Fl. penchées, verdâtres.*

2170. LISIANTHE *bleuâtre*. Dict. n°. 12.
L. à tige tétragone, ailée; feuilles ſeſſiles, lancéolées; lobes de la corolle pointus; étam. inégales.
L. n. la Guiane. ⊙

2163. LISIANTHUS *acuminatus*.
L. fruteſcens, foliis ovatis, acuminatis; corolla ſubcampanulata: lobis brevibus, ſubrotundis.
E Guadelupa. *D. Badier.*

2164. LISIANTHUS *glauciſolius*.
L. foliis ſeſſilibus, ovato-oblongis; pedunculis elongatis, unifloris, laciniis corollæ tubo longioribus.
..... *Jacq. collect. 1, p. 64. & ic. rar. 1.* ♆

2165. LISIANTHUS *purpuraſcens*. T. 107. f. 2.
L. foliis ſeſſilibus, ovatis, acutis; corollæ cernuæ, incurvæ, laciniis reflexis.
Ex Guiana. ⊙ *Aubl. t. 79.*

2166. LISIANTHUS *alatus*.
L. foliis ovato-lanceolatis, ſubſeſſilibus; caule tetragono: angulis membranaceis; panicula dichotoma; floribus albidis.
Ex Guiana. ⊙ *Aubl. t. 80.*

2167. LISIANTHUS *glaber*.
L. glaber, foliis ovatis, petiolatis; corymbis terminalibus.
Ex America merid. *L. f. ſuppl. 134. Smith. Ic. pl. faſc. 2. t. 29.*

2168. LISIANTHUS *chelonoides*.
L. foliis elliptico-oblongis, ſubconnatis; caule tereti; panicula racemoſa; floribus luteis.
Ex Surinamo. *L. chelonoides. L. f. ſuppl.*

2169. LISIANTHUS *grandiflorus*.
L. foliis connatis, ovato-acuminatis; corollarum lobis ſubrotundis, ſubſinuatis; ſtaminibus inæqualibus.
Ex Guiana. ⊙ *Aubl. t. 81.*

2170. LISIANTHUS *cæruleſcens*.
L. caule tetragono, alato; foliis ſeſſilibus, lanceolatis; corollarum lobis acutis; ſtaminibus inæqualibus.
Ex Guiana. ⊙ *Aubl. t. 82.*

2171. LISIANTHE *à longs péd.* Dict. n°. 13. L. à corolles subcampanulées, quinquefides, crénelées; pédoncule très-long, terminal. *L. n.* Saint-Domingue. ⊙ *Feuilles ovales-oblongues, trinerves. Fleurs bleues.*

* LISIANTHE (*à longues étamines*) à feuilles ovales-lancéolées; péd. trichotomes; parties génitales très-longues. ♄ *La Jamaïque.*

* LISIANTHE (*à feuilles larges*) à feuilles lancéolées-elliptiques, acuminées; pédoncules trichotomes; parties génitales incluses. ♄ *La Jamaïque.*

* LISIANTHE (*à ombelle*) à feuilles alongées, ovoïdes; fleurs terminales, pédonculées, en ombelle; découpures de la corolle très-courtes, obtuses, droites. ♄ *La Jamaïque.*

Explication des fig.

Pl. 107. LISIANTHE *à longues feuilles.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Corolle ouverte. (*c*) Calice. (*d*) Etamine. (*e*) Pistil. (*f*, *g*) Capsule terminée par le style. (*h*) Une de ses valves coupée en travers. (*i*) Feuille séparée.

Pl. 107. f. 2. LISIANTHE *purpurine.* (*a*) Fleur entière séparée. (*b*) Corolle ouverte; étamines, pistil, &c.
Pl. 107. f. 3. LISIANTHE *caréné.*

307. CHIRONE.

Caract. essent.

Cor. presqu'en roue. Anthères défleuries, cont. en spirale. Style incliné. Fruit 1-loculaire.

Caract. nat.

Cal. monophylle, quinquefide, droit, persistant: à découpures oblongues, pointues.
Cor. monopétale, presqu'en roue, régulière. Tube à peine plus long que le calice. Limbe partagé en cinq découpures ovales, ouvertes.
Etam. Cinq filamens, courts, attachés au sommet du tube. Anthères oblongues, droites, subconniventes, contournées en spirale étant défleuries.
Pist. Ovaire supérieur, ovale. Style filiforme, un peu plus long que les étamines, incliné. Stigmate en tête, montant.

2171. LISIANTHUS *exaltatus.* L. corollis subcampanulatis, quinquefidis, crenatis; pedunculo longissimo, terminali. E Domingo. ⊙ *Gentiana exaltata. Lin. Lisiantho glaucifolio valdè affinis.*

* LISIANTHUS (*exsertus*) foliis ovato-lanceolatis; pedunculis trichotomis; genitalibus longissimis. *Swartz. Prodr. p. 40.*

* LISIANTHUS (*latifolius*) foliis lanceolato-ellipticis, acuminatis; pedunculis trichotomis, genitalibus inclusis. *Swartz. Prodr. 40.*

* LISIANTHUS (*umbellatus*) foliis elongatis, obovatis; floribus terminalibus, pedunculatis, umbellatis; laciniis corollæ brevissimis, obtusis, erectis. *Swartz. Prodr. 40.*

Explicatio iconum.

Tab. 107. f. 1. LISIANTHUS *longifolius.* (*a*) Flos integer. (*b*) Corolla aperta. (*c*) Calyx. (*d*) Stamen. (*e*) Pistillum. (*f*, *g*) Capsula stylo terminata. (*h*) Ejusdem valvula transversim secta. (*i*) Folium separatum. *Fig. ex D. Brown.*
Tab. 107. f. 2. LISIANTHUS *purpurascens.* (*a*) Flos integer separatus. (*b*) Corolla aperta; stamina, pistillum, &c. *Fig. ex Aubl.*
Tab. 107. f. 3. LISIANTHUS *carinatus.*

307. CHIRONIA.

Charact. essent.

Cor. subrotata. Antheræ defloratæ, spiraliter contortæ. Stylus declinatus. Fruct. 1-locul.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquefidus, erectus, persistens: laciniis oblongis, acutis.
Cor. monopetala, subrotata, æqualis. Tubus vix calyce longior. Limbus quinquepartitus: patens: laciniis ovatis.
Stam. Filamenta quinque, brevia, ex apice tubi enata. Antheræ oblongæ, erectæ, subconniventes, defloratæ spiraliter contortæ.

Pistil. Germen superum, ovatum. Stylus filiformis, staminibus paulo longior, declinatus. Stigma capitatum, assurgens.

Péric. Capſule ou baie ovale, uniloculaire.
Sem. nombreuſes, petites, ovales-globuleuſes, ſcrobiculées, attachées à des placenta latéraux.

Tableau des eſpèces.

2172. CHIRONE *trinerve*. Dict. n°. 1.
C. herbacée, à folioles calicinales carinées par un tranchant membraneux.
L. n. l'iſle de Céylan. ⊙

2173. CHIRONE *fl. de jaſmin*. Dict. n°. 2.
C. à tige herbacée, tétrgonea; feuilles lancéolées, calices ſubulés.
L. n. le Cap de Bonne-Eſpérance. *Sonnerat.*

2174. CHIRONE *lycnoïde*. Dict. n°. 3.
C. à tige ſimple; feuilles linéaires-lancéolées, plus longues que les entrenœuds.
L. n. le Cap de Bonne-Eſpérance.

2175. CHIRONE *à f. de mélampire*. Dict. ſup.
C. à feuilles lancéolées, ſeſſiles, décurrentes par les bords; calice plus court que le tube.
L. n. le Cap de B. Eſp. *Dict. Eſp. 3. Obſerv.*

2176. CHIRONE *campanulée*. Dict. n°. 4.
C. herbacée, à feuilles preſque linéaires; calices de la longueur de la corolle.
L. n. le Canada. *Fl. purpurines.*

2177. CHIRONE *angulaire*. Dict. n°. 5.
C. herbacée, à tige à angles tranchans; feuilles ovales, amplexicaules.
L. n. la Virginie. *Corymbe terminal.*

2178. CHIRONE *en cime*. Dict. ſuppl.
C. herbacée, à tige tétragone; feuilles lancéolées, ſeſſiles; cime terminale; bractées linéaires.
L n. la Caroline. *Fraſer.*

2179. CHIRONE *à tige nue*. Dict. n°. 10.
C. à tiges ſubdiphylles, très-ſimples, unifl. feuilles oblongues, un peu obtuſes; dents calicinales ſétacées.
L. n. le Cap de B. Eſp.

Peric. Capſula vel bacca ovata, unilocularis.
Sem. numeroſa, parva, ovato-globoſa, ſcrobiculata, placentis lateralibus affixa.

Conſpectus ſpecierum.

2172. CHIRONIA *trinervia*.
C. herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis.
Ex Zeylona. ⊙ *Burm. Zeyl. t. 67.*

2173. CHIRONIA *jaſminoides*. T. 108. f. 2.
C. caule herbaceo, tetragono; foliis lanceolatis; calycibus ſubulatis.
E Cap. B. Spei. *Limbus tubo paulo longior.*

2174. CHIRONIA *lychnoides*.
C. caule ſimplici; foliis lineari-lanceolatis, internodiis longioribus.
E Capite Bonæ Spei.

2175. CHIRONIA *melampyrifolia*.
C. foliis lanceolatis, ſeſſilibus, lateribus decurrentibus; calyce tubo breviore.
E Cap. B. Spei. *Limbus cor. tubo longior.*

2176. CHIRONIA *campanulata*.
C. herbacea, foliis ſublinearibus; calycibus longitudine corollæ.
E Canada. *Ped. longi, 1-flori.*

2177. CHIRONIA *angularis*.
C. herbacea, caule acutangulo; foliis ovatis, amplexicaulibus.
Ex Virginia. *Corymbus terminalis.*

2178. CHIRONIA *cymoſa*.
C. herbacea; caule tetragono; foliis lanceolatis, ſeſſilibus; cyma terminali; bracteis linearibus.
E Carolina. *An Ch. lanceolata. Walt. fl. car.*

2179. CHIRONIA *nudicaulis*.
C. caulibus ſubdiphyllis, ſimpliciſſimis, unifloris; foliis oblongis, obtuſiuſculis; calycinis dentibus ſetaceis.
E Cap. B. Spei. *Lin. f. ſuppl. 162.*

2180. CHIRONE *uniflore*. Dict. n°. 9.
C. à tige ſimple, effilée, anguleuſe; feuilles linéaires-lancéolées, un peu plus courtes que les entrenœuds; fleur grande, terminale.
L. n. le Cap de Bonne-Eſpérance. *Sonnerat. Tige à 6 angles.*

2181. CHIRONE *linoïdes*. Dict. n°. 6.
C. herbacée, à feuilles linéaires, glauques; calices ſemi-quinquefides, un peu pointus.
L. n. le Cap de Bonne-Eſpérance. ♆ *Plante glauque, droite, à fl. d'un rouge très-agréable.*

2182. CHIRONE *baccifère*. Dict. n°. 7.
C. à tige très-rameuſe, tétragone, fruteſcente à la baſe; feuilles linéaires; verdâtres; péricarpes en baies.
L. n. l'Afrique. *Calices très-courts.* ♄

2183. CHIRONE *tétragone*. Dict. n°. 11.
C. frutiqueuſe, à feuilles ovales, trinerves, un peu obtuſes; folioles cal. un peu obtuſes, carinées.
L. n. le Cap de Bonne Eſpérance. ♄

2184. CHIRONE *fruteſcente*.
C. frutiqueuſe, à feuilles linéaires-lancéolées, charnues, ſubtomenteuſes; calices enflés, preſqu'ovales, pubeſcens.
L. n. l'Afrique. ♄ *Ch. velue, Dict. n°. 8.*

Explication des fig.

Pl. 108. f. 1. CHIRONE *fruteſcente*. (*a*) Rameau florifère. (*b*) Fleur épanouie. (*c*) Corolle ſéparée vue poſt. (*d*) La même ouverte. (*e*) Etamine ſéparée. (*f*) Piſtil.
Pl. 108. f. 2. CHIRONE *fleur de jaſmin*. Pl. 108. f. 3. CHIRONE *uniflore*.

308. PHLOX.

Caract. eſſent.

Cor. hypocratériforme. Etam. dans le tube. Stigm. 3-fide. Capſ. à 3 loges. Sem. ſolit.

Caract. nat.

Cal. monophylle, cylindracé, profondément quinquefide, perſiſtant: à découp. pointues.

2180. CHIRONIA *uniflora*. T. 108. f. 3.
C. caule ſimplici, virgato, anguloſo; foliis lineari-lanceolatis, internodiis ſubbrevioribus; flore magno terminali.
E Cap. Bonæ Spei. *Folia nervo marginibusque decurrunt.*

2181. CHIRONIA *linoides*.
C. herbacea, foliis linearibus glaucis; calycibus ſemiquinquefidis, acutiuſculis.
E Capite Bonæ Spei. ♆ *Breyn. Cent. t. 90. Antheræ non ſpiraliter contortæ.*

2182. CHIRONIA *baccifera*.
C. caule ramoſiſſimo, tetragono, baſi fruteſcente; foliis linearibus, viridibus; pericarpiis baccatis.
Ex Africa. ♄ *Gærtn. t. 114.*

2183. CHIRONIA *tetragona*.
C. fruticoſa, foliis ovatis, trinerviis, obtuſiuſculis; calycinis foliolis obtuſiuſculis, carinatis.
E Cap. B. Spei. ♄ *Lin. f. ſuppl. 161.*

2184. CHIRONIA *fruteſcens*. T. 108. f. 1.
C. fruticoſa, foliis lineari-lanceolatis, carnoſis, ſubtomentoſis; calycibus inflato-ſubovatis, pubeſcentibus.
Ex Africa. ♄ *Fl. magni, purpurei.*

Explicatio iconum.

Tab. 108. f. 1. CHIRONIA *fruteſcens*. (*a*) Ramulus florifer. (*b*) Flos expanſus. (*c*) Corolla ſeparata poſtice ſpectata. (*d*) Eadem aperta. (*e*) Stamen ſeparatum. (*f*) Piſtillum.
Tab. 108. f. 2. CHIRONIA *jaſminoides*. Tab. 108. f. 3. CHIRONIA *uniflora*.

308. PHLOX.

Charact. eſſent.

Cor. hypocrateriformis. Stam. incluſa. Stigma 3-fidum. Capſ. 3 locularis. Sem. ſolitaria.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, cylindraceus, profundè quinquefidus, perſiſtens: laciniis acutis.

Cor.

Cor. monopétale, hypocratériforme. Tube cylindracé, plus long que le calice, plus étroit inf. un peu courbé. Limbe plane, régulier, partagé en cinq découp. obtuſes, plus courtes que le tube.

Etam. Cinq filamens, enfermés dans le tube de la corolle, dont trois ſont plus longs. Anth. droites, les trois ſupérieures à l'orifice.

Piſt. Ovaire ſupérieur, conique. Style filiforme, de la longueur du tube. Stigmate trifide.

Péric. Capſ. ovale, trigone, trilocul. trivalve.

Sem. ſolitaires, ovales.

Tableau des eſpèces.

2185. PHLOX *paniculé.* Dict. n°. 1.
P. à feuilles lancéolées, planes, ſcabres ſur les bords; tige glabre; corymbes paniculés.
L. n. l'Amér. ſept. ♆ *Fl. d'un pourpre violet.*

2186. PHLOX *ondulé.* Dict.
P. à feuilles oblongues-lancéolées, un peu ondulées, ſcabres ſur les bords; tige glabre, corymbes paniculés.
L. n. l'Amérique ſeptentrionale. ♆ *Ce n'eſt peut-être qu'une variété du précédent; mais il s'élève davantage, & ſes fleurs ſont plus grandes, d'un pourpre extrêm. agréable.*

2187. PHLOX *tacheté.* Dict. n°. 2.
P. à feuilles lancéolées, glabres; tige tachetée, un peu ſcabre; grappe en corymbe.
L. n. l'Amérique ſeptentrionale. ♆

2188. PHLOX *de Caroline.* Dict. n°. 3.
P. à feuilles lancéolées, glabres; tige ſcabre; corymbe preſque nivellé.
L. n. la Caroline. ♆

2189. PHLOX *glabre.* Dict. n°. 4.
P. à feuilles linéaires-lancéolées, glabres; tige liſſe; corymbe terminal.
L. n. la Virginie. ♆ *Fl. d'un pourpre clair.*

2190. PHLOX *divergent.* Dict.
P. velu, à feuilles ovales-lancéolées: les ſupérieures, alternes; tige foible; lobes de la corolle échancrées.
L. n. la Virginie. ♆ *Cor. d'un bleu très-pâle.*

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindraceus, calyce longior, infernè anguſtior, ſubincurvus. Limbus planus, æqualis, quinquepartitus: laciniis obtuſis, tubo brevioribus.

Stam. Filamenta quinque, intra tubum corollæ, quorum tria longiora; antheræ erectæ; ſuperioribus tribus ad faucem.

Piſt. Germen ſuperum, conicum. Stylus filiformis, longitudine tubi. Stigma trifidum.

Peric. Capſula ovata, trigona, trilocul. trivalvis.

Sem. ſolitaria, ovata.

Conſpectus ſpecierum.

2185. PHLOX *paniculata.*
P. foliis lanceolatis, planis, margine ſcabris; caule lævi; corymbis paniculatis.
Ex Amer. ſeptentr. ♆ *Fl. purpuro violacei.*

2186. PHLOX *undulata.*
P. foliis oblongo-lanceolatis, ſubundulatis, margine ſcabris; caule lævi; corymbis paniculatis.
Ex America ſept. ♆ *Hort. Kew. 1. p. 205. Præcedenti nimis affinis: Differt tamen caule altiore, floribus majoribus, amæniſſimè purpureis.*

2187. PHLOX *maculata.*
P. foliis lanceolatis, lævibus; caule maculato, ſcabriuſculo; racemo corymboſo.
Ex Amer. ſeptentr. ♆ *Gærtn. t. 62.*

2188. PHLOX *Caroliniana.*
P. foliis lanceolatis, lævibus; caule ſcabro; corymbo ſubfaſtigiato.
E Carolina. ♆ *Mart. cent. t. 10.*

2189. PHLOX *glaberrima.*
P. foliis lineari-lanceolatis, glabris; caule lævigato; corymbo terminali.
Ex Virginia. ♆ *Dill. Elth. t. 166. f. 202.*

2190. PHLOX *divaricata.*
P. hirſuta. foliis ovato-lanceolatis: ſuperioribus alternis; caule flaccido; lobis corollæ emarginatis.
Ex Virginia. ♆ *Mill. ic. t. 205. f. 2.*

2191. PHLOX *ovale*. Dict.
P. à feuilles ovales ; fleurs solitaires.
L. n. la Virginie. ♆

2192. PHLOX *pileux*. Dict.
P. à feuilles linéaires-lancéolées, velues ; tige droite, pileuse ; corymbes terminaux
L. n. la Virginie, la Caroline. ♆ *Frafer.*

2193. PHLOX *de Sibérie*. Dict.
P. à feuilles linéaires, velues, droites ; pédoncules uniflores, presque solitaires.
L. n. la Sibérie. ♆ *Comm. par M. Patrin.*

2194. PHLOX *subulé*. Dict.
P. à feuilles subulées, velues ; tige villeuse ; fleurs presqu'en corymbe.
L. n. la Virginie. ♆ *Comm. par M. Fraser.*

2195. PHLOX *sétacé*. Dict.
P. à feuilles sétacées, glabres ; fleurs solitaires.
L. n. la Virginie. *N'est-ce pas une variété de la précédente ?*

* PHLOX (*odorant*) à feuilles ovales-lancéolées, lisses de toutes parts, tige très-glabre ; grappe paniculée. ♆ *L'Am. sept. Fl. blanches.*

Explication des fig.

Pl. 108. f. 1. PHLOX *paniculé*. (*a*) Sommité de la tige, garnie de fleurs. *Les feuilles sont plus rétrécies à leur base.* (*b*) Fleurs entières. (*c*) Corolle ouverte. (*d*) Calice, style. (*e*) Pistil séparé. (*f*) Ovaire coupé transversalement.
Pl. 108. f. 2. PHLOX *subulé*.
Pl. 108. f. 3. PHLOX *tacheté*. Détails du fruit d'après Gærtner.

309. GENTIANE.

Caract. essent.

COR. 1-pétale, le plus souvent 5-fide. Style bifide au sommet. Capf. 1-loculaire, bivalve. Sem. attachées aux parois de la capsule.

Caract. nat.

Cal. monophylle, quinquefide ; à découpures droites, pointues.

2191. PHLOX *ovata*.
P. foliis ovatis ; floribus solitariis,
Ex Virginia. ♆ *Pluk. t. 348. f. 4.*

2192. PHLOX *pilosa*.
P. foliis lineari-lanceolatis, villosis ; caule erecto, piloso ; corymbis terminalibus.
Ex Virginia, Carolinia. ♆ *Pluk. t. 98. f. 1.*

2193. PHLOX *Sibirica*.
P. foliis linearibus, villosis, erectis ; pedunculis unifloris, subsolitariis.
Ex Sibiria. ♆ *Gmel. sib. 4. t. 46. f. 2.*

2194. PHLOX *subulata*. T. 108. f. 2.
P. foliis subulatis, hirsutis ; caule villoso ; floribus subcorymbosis.
Ex Virginia. ♆ *Lobi corollæ emarginati.*

2195. PHLOX *setacea*.
P. foliis setaceis, glabris ; floribus solitariis.
Ex Virginia. *Pluk. t. 98. f. 3.*

* PHLOX (*suaveolens*) foliis ovato-lanceolatis, undique lævibus ; caule glaberrimo, racemo paniculato. *Hort. Kew. 206.* ♆

Explicatio iconum.

Tab. 108. f. 1. PHLOX *paniculata*. (*a*) Summitas caulis onusta. *Folia basi magis angustata.* (*b*) Flores integri. (*c*) Corolla aperta. (*d*) Calyx, stylus. (*e*) Pistillum separatum. (*f*) Germen immaturum transversim sectum.
Tab. 108. f. 2. PHLOX *subulata*.
Tab. 108 f. 3. PHLOX *maculata*. Partes fructus ex Gærtnero desumtæ.

309. GENTIANA.

Charact. essent.

COR. 1-petala, sæpius 5-fida. Stylus apice bifidus. Capf. 1-locularis, bivalvis. Sem. parietibus capsulæ affixa.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquefidus : laciniis erectis, acutis.

Cor. monopétale, campanulée ou infundibuliforme, rarement en roue, le plus ſouvent quinquefide : à limbe variant dans ſa forme.

Etam. Cinq filamens, rarement quatre, ſubulés, plus courts que la corolle. Anth. oblongues, quelquefois rapprochées, preſque réunies.

Piſt. Ovaire ſupérieur, oblong, cylindracé. Style ſouvent très-court, bifide au ſommet. Deux ſtigmates un peu obtus.

Péric. Capſule oblongue, cylindrique ou conique, acuminée, uniloculaire, bivalve.

Sem. nombreuſes, petites, attachées longitudinalement aux parois ou aux bords de la capſ.

Tableau des eſpèces.

* *Corolles ſubquinquefides : en roue ou campanulées.*

2196. GENTIANE *jaune.* Dict. n°. 3.
G. à corolles en roue, ſubquinquefides, faſciculées en verticilles ; calices ſpathacés.
L. n. les reg. montueuſes de l'Europe. ♃

2197. GENTIANE *pourprée.* Dict. n°. 2.
G. à corolles campanulées, ſubſexfides, ponctuées ; découp. ovales-lancéolées ; calice ſpathacé.
L. n. les mont. de la Suiſſe, &c. ♃

2198. GENTIANE *ponctué.* Dict. n°. 2.
G. à corolles campanulées, ponctuées, ſubſexfides : à découp. & ſinus un peu obtus ; calice ſubſexfide.
L. n. les mont. de la Suiſſe, &c. ♃

2199. GENTIANE *albiflore.* Dict. ſuppl.
G. à corolles campanulées, quinquefides, ponctuées par bandes ; feuilles oblongues-lancéolées.
L. n. la Sibérie. ♃ *Cor. blanches, à points bleuâtres.*

2200. GENTIANE *aſclepiade.* Dict. n°. 4.
G. à corolles campanulées, quinquefides, oppoſées, ſeſſiles ; feuilles amplexicaules.
L. n. l'Autriche, la Suiſſe, &c. ♃ *Fl. bleuâtres.*

Cor. monopetala, campanulata vel infundibuliformis, rarò rotata, ſæpius quinquefida : limbo forma vario.

Stam. Filamenta quinque, rariùs quatuor, ſubulata, corolla breviora. Antheræ oblongæ, interdum approximatæ, ſubcoalitæ.

Piſt. Germen ſuperum, oblongum, cylindraceum. Stylus ſæpe breviſſimus, apice bifidus. Stigmata duo, obtuſiuſcula.

Peric. Capſula oblonga, teres vel conica, acuminata, unilocularis, bivalvis.

Sem. numeroſa, parva, parietibus vel marginibus capſulæ longitudinaliter affixa.

Conſpectus ſpecierum.

* *Corollis ſubquinquefidis : rotatis vel campanulatis.*

2196. GENTIANA *lutea.* T. 109. f. 1.
G. corollis rotatis, ſubquinquefidis, faſciculato-verticillatis ; calycibus ſpathaceis.
Ex Europæ montoſis. ♃ *Fl. lutei.*

2197. GENTIANA *purpurea.*
G. corollis campanulatis, ſubſexfidis, punctatis : ſegmentis ovato-lanceolatis ; calyce ſpathaceo.
Ex alpibus Helveticis, &c. ♃

2198. GENTIANA *punctata.*
G. corollis campanulatis, ſubſexfidis, punctatis : ſegmentis ſinubuſque obtuſiuſculis ; calyce ſubſexfido.
Ex alpibus Helveticis, &c. ♃

2199. GENTIANA *albiflora.*
G. corollis campanulatis, quinquefidis, faſciatim punctatis ; foliis oblongo-lanceolatis.
Ex Sibiria. ♃ *Pallas. It. 3. 724. tab. l. f. 2.*

2200. GENTIANA *aſclepiadea.* T. 109. f. 3.
G. corollis campanulatis, quinquefidis, oppoſitis, ſeſſilibus ; foliis amplexicaulibus.
Ex Auſtria, Helvetia, &c. ♃ *Jacq. fl. auſtr. 4. 328.*

2201. GENTIANE *d'automne*. Dict. n°. 5.
G. à corolles campanulées, quinquefides, oppoſées, pédonculées; feuilles linéaires.
L. n. les prés humides de l'Eur. ♃ *Fl. bleues.*
β. La même moins élevée, à feuilles plus larges.

2202. GENTIANE *de Virginie*. Dict. n°. 6.
G. à corolles quinquefides, campanulées, ventrues, verticillées; feuilles ovales-lancéol.
L. n. la Virginie. ♃ *Fl. d'un bleu pâle, rayées.*

2203. GENTIANE *velue*. Dict. n°. 7.
G. à corolles quinquefides, campanulées, ventrues; feuilles velues.
L. n. la Virginie. ♃

2204. GENTIANE *cauleſcente*. Dict. n°. 10.
G. à corolle quinquefide, oblongue-campanulée; tige preſque nue, plus longue que la fleur.
L. n. les mont. de la Suiſſe, &c. ♃

2205. GENTIANE *à grande fleur*. Dict. n°. 9.
G. à corolle quinquefide, campanulée, plus longue que la tige; calice court.
L. n. les mont. de la France, la Suiſſe, &c. ♃
(*a*) *A feuilles ovales-lancéolées, pointues.*
(*β*) *A feuilles ovales, un peu obtuſes.*

2206. GENTIANE *à longues f.* Dict. n°. 11.
G. à corolles quinquefides, campanulées; feuilles rad. lancéolées, très-longues; tige couchée.
L. n. la Sibérie. ♃ *Suppl. p. 174.*

2207. GENTIANE *des rochers*. Dict. n°. 12.
G. à corolles quinquefides, campanulées; feuilles ſpatulées.
L. n. la Nouvelle-Zélande. *Suppl. p. 175.*

2208. GENTIANE *calycinale*. Dict. n°. 13.
G. à corolles quinquefides, preſqu'en roue, à peine de la grandeur du calice; capſules glob. poſées ſur un cal. en étoile.
L. n. La Louiſiane, la Caroline.

2209. GENTIANE *naine*. Dict. n°. 14.
G. à corolle quinquefide, campanulée, barbue à ſon orifice; feuilles caulinaires, ovales.

2201. GENTIANA *pneumonanthe*. T. 109. f. 2.
G. corollis campanulatis, quinquefidis, oppoſitis, pedunculatis; foliis linearibus.
Ex Europæ pratis humidis. ♃ *Fl. cærulei.*
β. Eadem humilior, foliis latioribus.

2202. GENTIANA *ſaponaria*.
G. corollis quinquefidis, campanulatis, ventricoſis, verticillatis; foliis ovato-lanceolatis.
Ex Virginia. ♃ *Fl. pallidè cærulei, lineati.*

2203. GENTIANA *villoſa*.
G. corollis quinquefidis, campanulatis, ventricoſis; foliis villoſis.
Ex Virginia. ♃ *An varietas præcedentis.*

2204. GENTIANA *cauleſcens*.
G. corolla quinquefida, oblongo-campanulata; caule ſubnudo, flore longiore.
Ex alpibus Helv. &c. ♃ *Barrel. Ic. 110. n. 2.*

2205. GENTIANA *grandiflora*.
G. corolla quinquefida, campanulata, caule longiore; calyce brevi.
Ex alpibus Galliæ, Helvetiæ, &c. ♃
(*a*) *Foliis ovato-lanceolatis, acutis.*
(*β*) *Foliis ovalibus obtuſiuſculis.*

2206. GENTIANA *decumbens*.
G. corollis quinquefidis, campanulatis, foliis radicalibus, lanceolatis, longiſſimis; caule decumbente.
E Sibiria. ♃ *Gmel. Sib. 4. t. 51. f. A.*

2207. GENTIANA *ſaxoſa*.
G. corollis quinquefidis, campanulatis; foliis ſpathulatis.
E Nova-Zelandia. *Forſt. act. Stock 1777. t. 3.*

2208. GENTIANA *calycina*.
G. corollis quinquefidis, ſubrotatis, calycem vix æquantibus; capſulis globoſis calyce ſtellato inſidentibus.
Ex Ludoviſiana, Carolina.

2209. GENTIANA *nana*.
G. corolla quinquefida, campanulata, fauce barbata; foliis caulinis ovatis.

L. n. les mont. de l'Autriche, &c. *Très-petite plante, ayant des rapports avec la G. nivale.*

** *A corolles ſubquinquefides, infundibuliformes.*

2210. GENTIANE *précoce.* Dict. n°. 15.
G. à corolle infundibuliforme, quinquefide; tiges courtes, ſimples, uniflores; feuilles ovales; les radicales plus grandes.
L. n. les mont. de l'Europe. ♆ *Corolle à limbe d'un beau bleu.*
β. La même? à feuilles plus étroites & plus pointues. Lobes de la cor. munis de quelques dents.

2211. GENTIANE *f. de ſerpolet.* Dict. n°. 18.
G. à corolle infundibuliforme, quinquefide; tiges ſimples, uniflores; feuilles ovales-obtuſes.

L. n. les mont. de la France, l'Italie, &c. *Petite plante à f. ovales, obtuſes, preſque rondes.*
β. La même à tige preſque nue. *Je l'ai reçue du canton de Fribourg.*
γ. La même à tige fort courte. *C'eſt peut-être auſſi le G. terglovenſis. Hacq. t. 2. f. 3.*

2212. GENTIANE *nivale.* Dict. n°. 19.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes; rameaux uniflores, alternes.
L. n. l'Europe, ſur les hautes montagnes. ⊙ *Petite plante à tige rameuſe. Voy. Jacq. collect. 3. p. 8.*

2113. GENTIANE *dentelée.* Dict. n°. 17.
G. à corolle quinquefide, infundibuliforme: à découp. obtuſes, dentées; tiges ſimples, uniflores.
L. n. les montagnes de la Suiſſe, la Bavière. *Le limbe de ſa corolle la diſtingue de la G. feuilles de ſerpolet.*

2114. GENTIANE *des Pyrénées.* Dict. n°. 16.
G. à corolle decemfide, infundibuliforme; tiges uniflores; feuilles linéaires.
L. n. les Pyrénées. ♆ *F. pointues.*

2215. GENTIANE *à longue fleur.* Dict. ſuppl.
G. ſubquinquefide, infundibuliforme, plus longue que la tige; feuilles ramaſſées, preſque linéaires.
L. n. la Sibérie. *Cor. longue de 2 pouces.*

Ex alpibus Auſtriacis, &c. *Jacq. miſc. 1. t. 18. f. 3. An Swertia carinthiaca ejuſd. miſc. 2. t. 6.*

** *Corollis ſubquinquefidis, infundibuliformibus.*

2210. GENTIANA *verna.*
G. corolla infundibuliformi, quinquefida; caulibus brevibus, ſimplicibus, unifloris; foliis ovatis: radicalibus majoribus.
Ex Europæ alpibus. ♆ *Clu. hiſt. p. 315. Gentiana bavarica. Jacq. obſ. 3. t. 71.*
β. Eadem? foliis anguſtioribus & acutioribus. G. pumila. Jacq. obſ. 2. t. 49.

2211. GENTIANA *ſerpyllifolia.*
G. corolla infundibuliformi, quinquefida, caulibus ſimplicibus, unifloris: foliis ovatis, obtuſis.
Ex alpibus Galliæ, Italiæ, &c. *G. cam. hort. t. 15. f. 1. Barrel. Ic. 101. f. 1. G. proſtrata. Jacq. coll. 2. t. 17. f. 2.*
β. Eadem caule ſubnudo. *G. elongata. Jacq. collect. 2. p. 88. t. 17. f. 3.*
γ. Eadem caule breviſſimo. *An G. brachiphylla. Pl. delph. 2. p. 528.*

2212. GENTIANA *nivalis.*
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus; ramis unifloris, alternis.
Ex Europæ, ſummis alpibus. ⊙ *Hall. helv. t. 17. Barrel. ic. 103. f. 1. 3. G. minima. lob. ic. 310.*

2113. GENTIANA *bavarica.*
G. corolla quinquefida, infundibuliformi: laciniis obtuſis, ſerratis; caulibus ſimplicibus unifloris.
Ex alpibus Helvetiæ, Bavariæ. *Cam. hort. t. 15. f. 2. Barrel. Ic. 101. f. 2.*

2114. GENTIANA *pyrenaica.*
G. corolla decemfida, infundibuliformi; caulículis unifloris; foliis linearibus.
Ex Pyrenæis. ♆ *Gouan. Ill. t. 2. f. 2.*

2115. GENTIANA *longiflora.*
G. ſubquinquefida, infundibuliformi, caule longiore; foliis confertis, ſublinearibus.

Ex Sibiria. *D. Patrin.*

2216. GENTIANE *dorée*. Dict. n°. 20.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes, très-acuminées : à orifice mutique & sans poils ; rameaux opposés.
L. n. sur les mont. de Bourgdoisan & de la Lapponie. ⊙ *Pl. fort rameuse.*

2217. GENTIANE *aquatique*. Dict. n°. 21.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes, terminales, sessiles ; f. à bords membraneux.
L. n. la Sibérie. *La fig. d'amman (Ruth. t. 1. (f. 1.) n'est pas bonne. Quant à celle de Gmelin (Sib. 4. t. 63. f. 1.) elle appartient au Swertia rotata ; les fl. étant en roue, avec des fossettes.*

2218. GENTIANE *utriculée*. Dict. n°. 22.
G. à corolles quinquefides, hypocratériformes; calices ailés par 5 angles tranchans.
L. n. les mont. de la France, la Suisse, &c. ⊙.

2219. GENTIANE *f. de linaire*. Dict. n°. 23.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes; style alongé ; feuilles linéaires, à une nervure.
L. n. l'Europe australe.

2220. GENTIANE *centaurelle*. Dict. n°. 24.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes; style alongé ; tige en cime supérieurement ; feuilles ovales, nerveuses.
L. n. l'Europe, aux lieux secs & incultes. ⊙ *La petite centaurée.*

2221. GENTIANE *des marais*. Dict. suppl.
G. à cor. quinquefides, infundibuliformes ; tige fort basse, très-rameuse de la base au sommet ; feuilles lisses.
L. n. la France, &c. aux l. humides & argilleux. ⊙ *Tige de 1 à 3 pouces*

2222. GENTIANE *à épi*. Dict. n°. 25.
G. à cor. quinquefides, infundibuliformes ; fleurs alternes, sessiles.
L. n. l'Europe australe. ⊙ *Rameaux en épis.*

2223. GENTIANE *maritime*. Dict. n°. 26.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes, jaunes ; tige subdichotome, pauciflore.
L. n. les l. maritimes de l'Europe australe. ⊙ *Style simple. Stigmates réunis, en masse.*

2216. GENTIANA *aurea*.
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus, acuminatissimis ; fauce imberbi muticaque ; ramis oppositis. L.
Ex alpibus Burdegalensibus & Lapponiæ. ⊙ *Barrel. Ic. 104.*

2217. GENTIANA *aquatica*.
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus, sessilibus ; foliis margine membranaceis.
E Sibiria. *D. Patrin. Planta subbipollicaris, ramosa. Cal. corolla brevior. Cor. 10-fida, acuta : laciniis 5 alternis majoribus subviridibus ; aliis 5 minoribus cæruleis.*

2218. GENTIANA *utriculosa*.
G. corollis quinquefidis, hypocrateriformibus ; calycibus plicato-carinatis.
Ex alpibus Galliæ, Helvetiæ, &c. ⊙

2219. GENTIANA *linariæfolia*.
G. cor. quinquefidis, infundibuliformibus ; stylo elongato; f. linearibus, subuninerviis.
Ex Europa australi. *Barrel. Ic. 423. 435. 436.*

2220. GENTIANA *centaurium*.
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus, stylo elongato ; caule supernè cymoso ; foliis ovatis, nervosis.
Ex Europæ apricis. ⊙ *Caulis infernè simplex. Fl. purpurei f. rosei.*

2221. GENTIANA *palustris*.
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus ; caule humillimo, à basi ad apicem ramosissimo ; foliis lævibus.
Ex Gallia, &c. in humidis & argillosis. ⊙ *Vaill. paris. t. 6. f. 1.*

2222. GENTIANA *spicata*.
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus ; floribus alternis, sessilibus.
Ex Europa australi. ⊙ *Barrel. Ic. 1242.*

2223. GENTIANA *maritima*.
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus, luteis ; caule subdichotomo, pauciflora.
Ex Europæ australis, maritimis. ⊙ *Stylus simplex. Stigmata coalita clavata.*

2224. GENTIANE *verticil.* Dict. n°. 27. pl. 1.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes; calices très-aigus, comme verticillés; tige ſimple, ſolitaire.
L. n. l'Amérique. *F. lancéolées. Fl. blanches.*

2224. GENTIANA *verticillata.*
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus; calycibus acutiſſimis, ſubverticillatis; caule ſimplici ſolitario.
Ex America. *Burm. amer. t. 81. f. 2.*

2225. GENTIANE *axillaire.* Dict. ſuppl.
G. à corolles quinquefides, infundibuliformes; calices obtus, comme verticillés; pluſieurs tiges ſimples.
L. n. l'Inde. ♆ *Sonner. Tiges de 3 à 5 pouces.*
β. La même à feuilles plus étroites.

2225. GENTIANA *axillaris.*
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus; calycibus obtuſis, ſubverticillatis; caulibus pluribus ſimplicibus.
Ex India. ♆ *Pluk. t. 343. f. 7.*
β. Ead. fol. anguſtiorib. Burm. afr. t. 74. f. 3.

2226. GENTIANE *du Pérou.* Dict. n°. 29.
G. à cor. quinquefides, infundibuliformes; tige dichotome, lâche; feuilles uninerves.
L. n. le Pérou, le Chili. *Juſſ. Cachen-Lagua.*

2226. GENTIANA *Peruviana.*
G. corollis quinquefidis, infundibulibuliformibus; caule dichotomo, patulo; foliis uninerviis.
E Peru, Chili. *Feuv. peruv. 2. p. 747. t. 36.*

2227. GENTIANE *alopécuroïde.* Dict. n°. 30.
G. à corolles quinquefides, très-pointues, infundibuliformes; fleurs ſeſſiles, unilatérales, très-ſerrées, preſqu'en épi.
L. n . . . Pl. de 3 à 4 pouces, fort rameuſe.

2227. GENTIANA *alopecuroides.*
G. corollis quinquefidis, acutiſſimis, infundibuliformibus; floribus ſeſſilibus, ſecundis, confertiſſimis, ſubſpicatis.
Ex . . . . (*Juſſ. herb.*) *An affinis coutoubeæ.*

2228. GENTIANE *des Açores.* Dict. n°. 31.
G. à cor. quinquefides, infundibuliformes; tige couchée, rameuſe, uniflore, feuilles ovoïdes.
L. n. les iſles Açores. *Fl. jaune.*

2228. GENTIANA *ſcilloides.*
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus; caule proſtrato ramoſo, unifloro; foliis obovatis.
Ex inſ. azoreis. *L. f. ſuppl. 175.*

2229. GENTIANE *à cinq fleurs.* Dict. n°. 32.
G. à cor. quinquefides, infundibuliformes; tige à angles tranchans; feuilles ovales, amplexicaules.
L. n. la Penſylvanie, le Dannemarck.

2229. GENTIANA *quinqueflora.*
G. corollis quinquefidis, infundibuliformibus; caule acutangulo; foliis ovatis, amplexicaulibus.
Ex Penſylvania, Dania. *Fl. Dan. 344.*

2230. GENTIANE *amarelle.* Dict. n°. 33.
G. à cor. quinquefides, hypocratériformes, barbues à l'orifice.
L. n. les prés ſecs de l'Eur. ⊙ *Cal. régulier.*

2230. GENTIANA *amarella.*
G. corollis quinquefidis, hypocrateriformibus, fauce barbatis.
Ex Europæ pratis, ſiccis. ⊙ *Fl. dan. t. 328.*

*** *A corolles quadrifides.*

*** *Corollis quadrifidis.*

2231. GENTIANE *des prés.* Dict. n°. 34.
G. à corolles quadrifides, barbues à l'orifice; découp. du calice inégales.
L. n. les prés ſecs & montagneux de l'Eur. ⊙

2231. GENTIANA *campeſtris.*
G. corollis quadrifidis, fauce barbatis; calycis laciniis inæqualibus.
Ex Europæ pratis ſiccis & montoſis. ⊙

2232. GENTIANE *ciliée*. Dict. n°. 35.
G. à corolles quadrifides, ciliées sur les bords.
L. n. sur les mont. de la France, Suisse, &c. ⊙

2233. GENTIANE *tétragone*. Dict. suppl.
G. à corolles quadrifides, imberbes; pédonc. longs, nuds, tétragones.
L. n. l'Europe boréale. *Linné a cité cette plante comme variété du G. campestris.*

2234. GENTIANE *croisette*. Dict. n°. 36.
G. à corolles quadrifides, imberbes; fleurs sessiles, verticillées; feuilles connées en gaine.
L. n. la France, &c. le long des chemins. ♃

2235. GENTIANE *sessile*. Dict. n°. 37.
G. à corolles quadrifides; fleurs sessiles; feuilles ovales.
L. n. le Chyli. *F. larges. Tige courte.*

2236. GENTIANE *filiforme*. Dict. n°. 38.
G. à corolles quadrifides, imberbes; tige dichotome, filiforme.
L. n. la France, &c. aux lieux humides. ⊙

2237. GENTIANE *fluette*. Dict. n°. 39.
G. à corolles quadrifides, presque fermées; découp. calicinales, linéaires; tige très-rameuse, dichotome, filiforme.
L. n. la France. *Pl. de 3 à 5 pouces.*
ε. La même à pédoncules plus longs. *A-t-elle des rapports avec le G. tetragona?*

2238. GENTIANE *quadrangul*. Dict. n°. 40.
G. à corolles quadrifides; tube ventru, couvert; calice quadrang. tronqué, à 4 dents.
L. n. le Pérou.

2239. GENTIANE *noirâtre*. Dict. n°. 41.
G. à corolles quadrifides, infundibuliformes, en cîme: à limbe subpubescent; feuilles linéaires, très-étroites.
L. n. Est-ce une espèce d'Houstone?

2240. GENTIANE *hétéroclite*. Dict. n°. 42.
G. à fleurs quadrifides, irrégulières; tige branchue.
L. n. les champs du Malabar, ⊙

2232. GENTIANA *ciliata*.
G. corollis quadrifidis, margine ciliatis.
Ex alpibus Galliæ, Helv. &c. *Barrel. ic.* 121.

2233. GENTIANA *tetragona*.
G. corollis quadrifidis, imberbibus; pedunculis longis, nudis, tetragonis.
Ex Europa boreali. *Fl. dan. t.* 318. *G. tenella. Friis act. haffn. vol.* 10. *t.* 2. *f.* 6.

2234. GENTIANA *cruciata*.
G corollis quadrifidis, imberbibus; floribus sessilibus, verticil. foliis connato-vaginantibus.
Ex Gallia, &c. ad vias. ♃ *Barrel. ic.* 65.

2235. GENTIANA *sessilis*.
G. corollis quadrifidis; floribus acaulibus; foliis ovatis.
E Chyli. *Few. peruv.* 3. *t.* 14. *f.* 2.

2236. GENTIANA *filiformis*.
G. corollis quadrifidis, imberbibus; caule dichotomo, filiformi.
Ex Gallia, &c. in humidis. ⊙ *Vaill. t.* 6. *f.* 3.

2237. GENTIANA *pusilla*.
G. corollis quadrifidis, subclausis; laciniis calycinis linearibus; caule ramosissimo, dichotomo, filiformi.
Ex Gallia. *Juss. Vaill. par. tab.* 6. *f.* 2.
ε. Eadem pedunculis longioribus. *An G. pumila. Gmel. sib.* 4. *tab.* 51. *f. B.*

2238. GENTIANA *quadrangularis*.
G. cor. quadrifidis, tubo ventricoso, tecto, calyce quadrangulari, truncato quadridentato.
E Peru.

2239. GENTIANA *nigricans*.
G. corollis quadrifidis, infundibuliformibus, cymosis; limbo subpubescente; foliis linearibus, angustissimis.
Ex..... (*Herb. Juss.*)

2240. GENTIANA *heteroclita*.
G. floribus quadrifidis, irregularibus; caule brachiato.
Ex agris Malabariæ. ⊙

* GENTIANE (*viſqueuſe*) à corolles quinquefides, monogynes; panic. trichotomes, bractées perfoliées; feuilles oblongues, trinerves. *Les Canaries.*

* GENTIANE (*montagnarde*) à cor. quinquefides, campanulées; feuilles en cœur ſeſſiles. *La Nouvelle-Zélande.*

* GENTIANE (*des frimats*) à corolles quinquefides, campanulées, terminales, ſeſſiles; feuilles obtuſes; les radicales linéaires-oblongues; les caulinaires lancéolées; tige ſubbiflore. *Le ſommet des mont. de l'Autriche.*

Explication des fig.

Pl. 109. f. 1. GENTIANE *jaune.* (*a*, *b*) Fleurs ſéparées. (*c*) Piſtil. (*d*) Capſule.

Pl. 109. f. 2. GENTIANE *d'automne.* (*a*) Partie ſupérieure de la tige, avec les fleurs. (*b*) Fleur ſéparée. (*c*) Calice. (*d*) Piſtil. (*e*) Capſule ouverte. (*f*) La même coupée tranſverſalement. (*g*) Semence.

Pl. 109. f. 3. GENTIANE *aſclepiade.*

310. SUERCE.

Caract. eſſent.

COR. en roue. 2 points excavés, à la baſe des découp. de la corolle. Capſ. 1-loculaire.

Caract. nat.

Cal. plane, perſiſtant, part. en cinq découp. lancéolées.

Cor. monopétale, en roue. Tube très-court. Limbe ouvert, plane, partagé en cinq découpures lancéolées, plus grandes que le calice. Dix points (*Deux à la baſe de chaque découp. de la corolle*) creuſés en leur côté intérieur, & entourés de cils petits, droits.

Etam. Cinq filamens, ſubulés, ouverts, plus courts que la corolle. Anthères inclinées.

Piſt. Ovaire ſupérieur, ovale-oblong, ſe terminant en un ſtyle court. Deux ſtigmates ſimples.

Péric. Capſule preſque cylindrique, acuminée, uniloculaire, bivalve.

Sem. nombreuſes, petites.

* GENTIANA (*viſcoſa*) corollis quinquefidis, monogynis; paniculis trichotomis; bracteis perfoliatis; foliis oblongis, trinerviis. *Hort. Kew.*

* GENTIANA (*montana*) corollis quinquefidis, campanulatis; foliis cordatis, ſeſſilibus. *Forſt. fl. auſtr. n°. 133.*

* GENTIANA (*frigida*) corollis quinquefidis, campanulatis, terminalibus, ſeſſilibus; foliis obtuſis; radicalibus lineari-oblongis; caulinis lanceolatis; caule ſubbifloro. *Jacq. collect. 2.* pag. 13.

Explicatio iconum.

Tab. 109. f. 1. GENTIANA *lutea.* (*a*, *b*) Flores ſeparati (*c*) Piſtillum. (*d*) Capſula. *Fig. ex Tournef.*

Tab. 109. f. 2. GENTIANA *pneumonanthe.* (*a*) Pars ſuperior caulis, cum floribus. (*b*) Flos ſeparatus. (*c*) Calyx. (*d*) Piſtillum. (*e*) Capſula dehiſcens. (*f*) Eadem tranſversè ſciſſa (*g*) Semen. *Fig. id.*

Tab. 109. f. 3. GENTIANA *aſclepiadea. Ex Sicco.*

310. SWERTIA.

Charact. eſſent.

COR. rotata. Puncta 2, excavata, ad baſim laciniarum corollæ. Capſ. 1-locularis.

Charact. nat.

Cal. quinquepartitus, planus, perſiſtens: laciniis lanceolatis.

Cor. monopetala, rotata. Tubus breviſſimus. Limbus patens, planus, quinquepartitus: laciniis lanceolatis, calyce majoribus. Puncta decem (*duo in baſi ſingulæ laciniæ corollæ*) à parte interna excavata, ſetis parvis erectis, cincta.

Stam. Filamenta quinque, ſubulata, patentia, corolla breviora. Antheræ incumbentes.

Piſt. Germen ſuperum, ovato-oblongum, deſinens in ſtylum brevem. Stigma duo ſimplicia.

Peric. Capſula ſubteres, acuminata, uniocularis, bivalvis.

Sem. Numeroſa, parva.

Tableau des espèces.

* *A corolles quinquefides.*

2241. SUERCE *vivace.* Dict.
S. à corolles quinquefides : feuilles radicales, ovales, pétiolées.
L. n. Les prés montagneux & humides de la France. ♃

2242. SUERCE *difforme.* Dict.
S. à corolles quinquefides : la terminale sexfide ; pédoncules très-longs; feuilles linéaires
L. n. La Virginie. *Fl. blanches.*

2243. SUERCE *en roue.* Dict.
S. à corolles quinquefides ; feuilles lancéolées-linéaires.
L. n. la Sibérie. *Péd. 1-flores. Cor. planes.*

2244. SUERCE *couchée.* Dict.
S. à corolles quinquefides ; feuilles linéaires-lancéolées ; tiges couchées.
L. n. l'Arabie. *Pl. glabre. Tiges filiformes. Corolles blanches, à veines violettes.*

* * *A corolles quadrifides.*

2245. SUERCE *corniculée.* Dict.
S. à corolles quadrifides, à quatre cornes.
L. n. la Sibérie. ⊙ *Patrin. Fl. d'un verd jaune.*

2246. SUERCE *dichotome.* Dict.
S. à corolles quadrifides, sans cornes.
L. n. la Sibérie. ⊙

Explication des fig.

Pl. 109. SUERCE *vivace.* (*a*) Fleur entière, séparée. (*b, c, d, e*) Pétales creusés à leur base par deux fossettes. (*f, g*) Etamines, pistil. (*h*) Calice. (*i*) Capsule entière. (*l*) La même coupée transversalement. (*m*) La même ouverte. (*n*) Plante entière, de grandeur naturelle.

311. VOYÈRE.

Caract. essent.

Cor. hypocratériforme : à tube très-long, renflé à la base & au sommet. Stigm. entier. Capf. 1-loculaire.

Conspectus specierum.

* *Corollis quinquefidis.*

2241. SWERTIA *perennis.* T. 109.
S. corollis quinquefidis ; foliis radicalibus, ovatis, petiolatis.
Ex Galliæ, &c. pratis montosis & humidis. ♃

2242. SWERTIA *difformis.*
S. corollis quinquefidis : terminali sexfida ; pedunculis longissimis ; foliis linearibus.
Ex Virginia. *Flores albi.*

2243. SWERTIA *rotata.*
S. corollis quinquefidis ; foliis lanceolato-linearibus.
E Sibiria. *Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 1.*

2244. SWERTIA *decumbens.*
S. corollis quinquefidis ; foliis lineari-lanceolatis ; caulibus decumbentibus.
Ex Arabia. *Vahl. symb. 1. p. 24. Parnassia polynectaria. Forsk. p. 207. & ic. t. 5. fig. B.*

* * *Corollis quadrifidis.*

2245. SWERTIA *corniculata.*
S. corollis quadrifidis, quadricornibus.
E Sibiria. ⊙ *Gmel. Sib. 4. t. 53. f. 3.*

2246. SWERTIA *dichotoma.*
S. corollis quadrifidis, ecornibus.
E Sibiria. ⊙ *Gmel. Sib. 4. t. 53. f. 2.*

Explicatio iconum.

Tab. 109. SWERTIA *perennis.* (*a*) Flos integer ; separatus. (*b, c, d, e*) Petala basi foveis duabus excavata. (*f, g*) Stamina, pistillum. (*h*) Calyx. (*i*) Capsula integra. (*l*) Eadem transversè scissa. (*m*) Eadem dehiscens. *Fig. ex Mill.* (*n*) Pl. integra, magnitudine naturali.

311. VOHIRIA.

Charact. essent.

Cor. hypocrateriformis : tubo longissimo, basi apiceque tumido. Stigma indivisum. Capf. 1-locularis.

Caract. nat.

Cal. monophylle, court, turbiné, quinquefide, droit, pointu.
Cor. monopétale, hypocratériforme. Tube très-long, cylindracé, renflé à la base & au sommet. Limbe quinquefide : à découp. ovales, ouvertes.
Etam. Cinq filamens très-courts, attachés à l'orifice du tube. Anthères oblongues.
Pist. Ovaire supérieur, oblong. Style filiforme, de la longueur du tube. Stigmate en tête, tronquée.
Péric. Capsule oblongue, uniloculaire, bivalve.
Sem. nombreuses, scobiformes, attachées aux bords des valves.

Tableau des espèces.

2247. VOYÈRE *bleue*. Dict.
V. à fleurs geminées ; découpures de la cor. arrondies.
L. n. les forêts de la Guiane.

2248. VOYÈRE *incarnate*. Dict.
V. à fleurs geminées ; découpures de la corolle pointues.
L. n. les forêts de la Guiane.

2249. VOYERE *spathacée*. Dict.
V. à tige multiflore ; bractées subspatacées ; découpures de la corolle oblongues.
L. n. la Guiane.

2250. VOYÈRE *à fleurs courtes*. Dict.
V. à tige subtriflore ; feuilles membraneuses ; tube de la corolle une fois plus long que le calice.
L. n. la Guiane. *Fl. jaunes, longues de 6 à 7 lignes.*

2251. VOYÈRE *uniflore*.
V. à tige comme sans feuilles, uniflore ; découpures de la corolle pointues.
L. n. les bois de la Martinique. ⊙ *Gentiane sans feuilles. Dict. n°. 28.*

Explication des fig.

Pl. 109. VOYERE *incarnate*. (*a*, *b*) Tige avec les fleurs. (*c*) Partie sup. de la corolle ouverte. (*d*) Pistil. (*e*) Capsule ouverte. (*f*) La même coupée transversalement.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, brevis, turbinatus, quinquefidus, acutus, erectus.
Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus longissimus, cylindraceus, basi apiceque tumidus. Limbus quinquefidus : laciniis ovatis, patentibus.
Stam. Filamenta quinque, brevissima, fauci tubi inserta. Antheræ oblongæ.
Pist. Germen superum, oblongum. Stylus filiformis, longitudine tubi. Stigma capitatum, truncatum.
Peric. Capsula oblonga, unilocularis, bivalvis.
Sem. Numerosa, scobiformia, marginibus valvularum affixa.

Conspectus specierum.

2247. VOHIRIA *cærulea*.
V. floribus geminatis ; corollæ laciniis rotundatis.
Ex Guianæ sylvis. *Aubl. t. 83. f. 2.*

2248. VOHIRIA *rosea*. T. 109.
V. floribus geminatis ; corollæ laciniis acutis.
Ex Guianæ sylvis. *Aubl. t. 83. f. 1.*

2249. VOHIRIA *spathacea*.
V. caule multifloro ; bracteis subspathaceis ; corollæ laciniis, oblongis.
Ex Guiana. *D. Richard.*

2250. VOHIRIA *breviflora*.
V. caule subtrifloro ; foliis membranaceis ; corollæ tubo calyce duplo longiore.
Ex Guiana. *D. Richard. Caulis 2-pollicaris.*

2251. VOHIRIA *uniflora*.
V. caule subaphyllo, unifloro ; corollæ laciniis acutis.
Ex Martinicæ sylvis. ⊙ *Gentiana aphylla. Jacq. amer. t. 60. f. 3.*

Explicatio iconum.

Tab. 109. VOHIRIA *rosea*. (*a*, *b*) Caulis cum floribus. (*c*) Pars superior corollæ aperta. (*d*) Pistillum. (*e*) Capsula dehiscens. (*f*) Eadem transversè scissa. *Fig. ex Aubl.*

312. MARIPE.

Caract. eſſent.

Cal. 5-phylle, embriqué. Cor. 1-pétale, pliſſée, 5-fide. Stigmate en tête. Péric. 2-loculaire : à loges 2 ſpermes.

Caract. nat.

Cal. pentaphylle, court, obtus : à folioles arrondies, embriquées, tomenteuſes en-dehors.

Cor. monopétale, preſqu'infundibuliforme, pliſſée ſupérieurement. Tube plus long que le calice, dilaté à ſa baſe. Limbe un peu ventru, quinquefide : à lobes obtus, demi-ouverts.

Etam. Cinq filamens, courts, attachés au tube de la corolle. Anthères oblongues, ſagittées.

Piſt. Ovaire ſupérieur, ovale. Style filiforme, de la longueur de la corolle. Stigmate en tête, pelté.

Péric..... biloculaire.

Sem. geminées, anguleuſes.

Tableau des eſpèces.

2252. MARIPE *grimpant*. Dict. 3. p. 711. *L. n.* la Guiane. ♄ *Cor. velues en-dehors.*

Explication des fig.

Pl. 110. Maripe *grimpant*. (*a*) Fleur ſéparée. (*b*) Corolle ouverte. (*c*) Etamine. (*d*) Calice, ſtyle. (*e*, *f*) Piſtil. (*g*, *i*) Péricarpe coupé avant ſa maturité. (*h*) Semence. (*l*) Rameau avec des fleurs non épanouies. (*m*) Partie de la panicule de grandeur naturelle.

313. AZALÉE.

Caract. eſſent.

Cor. 1-pétale, irrégulière. Etam. attachées au réceptacle. Capſ. 5-loculaire.

Caract. nat.

Cal. petit, partagé en cinq, droit, pointu, perſiſtant.

Cor. monopétale, campanulée, ou infundibuliforme, un peu irrégulière, quinquefide : à découpures ouvertes.

312. MARIPA.

Charact. eſſent.

Cal. 5-phyllus, imbricatus. Cor. 1-petala, plicata, 5 fida. Stigma capitatum. Peric. 2-loculare : loculis 2-ſpermis.

Charact. nat.

Cal. pentaphyllus, brevis, obtuſus : foliolis rotundatis, imbricatis, extùs tomentoſis.

Cor. monopetala, ſubinfundibuliformis, ſupernè plicata. Tubus calyce longior, baſi dilatatus. Limbus ſubventricoſus, quinquefidus; lobis obtuſis, erecto-patulis.

Stam. Filamenta quinque, brevia, tubo corollæ inſerta. Antheræ oblongæ, ſagittatæ.

Piſt. Germen ſuperum, ovatum. Stylus filiformis, longitudine corollæ. Stigma capitatum, peltatum.

Peric...... biloculare.

Sem. bina, angulata.

Conſpectus ſpecierum.

2252. MARIPA *ſcandens*. T. 110. Ex Guiana. ♄ *Aubl. t. 91.*

Explicatio iconum.

Tab. 110. Maripa *ſcandens*. (*a*) Flos ſeparatus. (*b*) Corolla aperta. (*c*) Stamen. (*d*) Galyx, ſtylus. (*e*, *f*) Piſtillum. (*g*, *i*) Pericarpium immaturum diſſectum. (*h*) Semen. (*l*) Ramus cum floribus inexpanſis. (*m*) Pars panic. magnitudine nat. *Fig. ex Aubl.*

313. AZALEA.

Charact. eſſent.

Cor. 1-petala, inæqualis. Stam. receptaculo inſerta. Capſ. 5-locularis.

Charact. nat.

Cal. parvus, quinquepartitus, acutus, erectus, perſiſtens.

Cor. monopetala, campanulata, aut infundibuliformis, ſubinæqualis, quinquefida : laciniis patentibus.

Etam. Cinq filamens, filiformes, attachés au réceptacle, quelquefois courbés. Anthères ovales.
Pist. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, de la longueur de la corolle. Stigmate obtus.
Péric. Capf. arrondie, quinqueloculaire, quinquevalve.
Sem. nombreuses, arrondies.

Tableau des espèces.

* *A corolles campanulées.*

2253. AZALÉE *pontique.* Dict. n°. 1.
A. à feuilles lancéolées, luisantes, glabres de chaque côté; grappes terminales.
L. n. le Levant, vers la Mer-Noire. ♄ *Fl. jaunes.*

2254. AZALÉE *des Indes.* Dict. n°. 2.
A. à fleurs presque solitaires; calices pileux.
L. n. les Indes orient. ♄ *Joli arbriss. d'env. 3 pieds? fleurs grandes, d'un rouge éclatant. Le même à feuilles plus petites & plus étroites. A peine differe-t-il de celui d'Hermann.*

2255. AZALÉE *feuilles de romarin.*
A. à fleurs solitaires; feuilles linéaires-lancéolées, repliées sur les bords, velues.
L. n. le Japon. ♄ *Cal. ferrugineux. Cor. jaune.*

2256. AZALÉE *de Lapponie.* Dict. n°. 3.
A. à feuilles elliptiques, parsemées de points concaves.
L. n. les mont. de la Lapponie. ♄ *Fl. purp.*

2257. AZALÉE *couchée.* Dict. n°. 4.
A. à rameaux diffus, couchés; feuilles ovales, lisses, très-petites, repliées sur les bords.
L. n. les mont. de l'Europe. ♄

** *A corolles infundibuliformes.*

2258. AZALÉE *glauque.* Dict. n°. 5.
A. à feuilles lancéolées-ovales, glauques endessous; fleurs blanches: étam. à peine plus longues que la corolle.
L. n. l'Amérique septentrionale. ♄

2259. AZALÉE *visqueuse.* Dict. n°. 6.
A. à feuilles lancéolées-ovales, scabres sur les bords, vertes des deux côtés; étamines plus longues que la corolle.

Stam. Filamenta quinque, filiformia, receptaculo inserta, interdum curva. Antheræ ovatæ.
Pist. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, longitudine cor. Stigma obtusum.
Peric. Capsula subrotunda, quinquelocularis, quinquevalvis.
Sem. Plurima, subrotunda.

Conspectus specierum.

* *Corollis campanulatis.*

2253. AZALEA *pontica.*
A. foliis lanceolatis, nitidis, utrinque glabris, racemis terminalibus.
Ex Oriente, versus Pontum eux. ♄ *Fl. lutei.*

2254. AZALEA *Indica.*
A. floribus subsolitariis; calycibus pilosis.
Ex Indiis orient. ♄ *Herm. Ludb. t. 163. Tsiutsusi. Kæmpf. t. 846. Eadem foliis minoribus & angustioribus. Reliq. Kæmpf. t. 55.*

2255. AZALEA *rosmarinifolia.*
A. floribus solitariis; foliis lineari-lanceolatis, margine reflexis, hirsutis
Ex Japonia. ♄ *Burm. Fl. ind. 42. t. 3. f. 3.*

2256. AZALEA *Lapponica.*
A. foliis ellipticis, punctis excavatis adspersis.
Ex alpibus Lapponicis. ♄ *Fl. lapp. t. 6. f. 1.*

2257. AZALEA *procumbens.* T. 110. f. 1.
A. ramis diffuso-procumbentibus; foliis ovatis, lævibus, minimis, margine reflexis.
Ex Europæ alpibus. ♄

* * *Corollis infundibuliformibus.*

2258. AZALEA *glauca.* T. 110. f. 2.
A. foliis lanceolato-ovatis, subtus glaucis; floribus albis; staminibus vix corolla longioribus.
Ex America sept. ♄

2259. AZALEA *viscosa.*
A. foliis lanceolato-ovatis, margine scabris, utrinque viridibus; staminibus corolla longioribus.

L. n. l'Amérique ſeptentrionale. ♄ *Fl. roſes, ou blanches & pourpres, quelquefois tout-à-fait blanches.*

β. La même à étamines très-longues. Fl. d'un rouge éclatant, quelquefois écarlattes. Les anthères ſont perforées au ſommet dans cette eſpèce ainſi que dans la précédente.

* AZALÉE (*pileuſe*) à feuilles pileuſes, blanches au ſommet; fleurs octandriques; corolles ovales. *Journal d'hiſt. nat. vol.* 1, *pag.* 410.

Explication des fig.

Pl. 110. f. 1. AZALÉE *couchée.* (*a*) Fleur entière. (*b*) Calice. (*c*) Corolle. (*d*) Etamines. (*f*, *g*) Capſule. (*h*) La même coupée. (*i*) La même à valves ouvertes.

Pl. 110. f. 2. AZALÉE *glauque.* (*a*, *b*) Sommité d'un rameau, avec les fleurs. (*c*) Corolle ouverte. (*d*) Calice. (*e*) Etamines, piſtil. (*f*) Attache des étamines. (*g*) Anthères groſſies. (*h*, *i*) Capſule entière & coupée. (*l*) Bourgeon. (*m*, *n*) Jeune fleur. (*o*) Feuille ſéparée.

314. EPACRIS.

Caract. eſſent.

COR. infundibuliforme, velue. 5 écailles à la baſe de l'ovaire. Capſ. à 5 loges.

Caract. nat.

Cal. partagé en cinq, régulier, perſiſtant: à folioles lancéolées.

Cor. monopétale, infundibuliforme, plus longue que le calice. Tube inſenſiblement élargi en un limbe quinquefide: à découp. ovales-pointues, velues en-deſſus.

Etam. Cinq filamens, très-courts, attachés au tube de la corolle. Anth. ovales, inclinées.

Piſt. Ovaire ſupérieur, arrondi, à cinq ſtries, environné à ſa baſe par cinq écailles, ovoïdes, échancrées. Style cylindrique, court. Stigmate en tête.

Péric. Capſule globuleuſe, applatie en-deſſus, à cinq loges, s'ouvrant par cinq valves.

Sem. nombreuſes, très-petites.

Ex America ſept. ♄ *Fl. roſei, vel ex albo purpurei, interdum omnino albi.*

β. Eadem ſtaminibus longiſſimis. A. nudiflora. L. Fl. rubicundi, interdum coccinei. Curtis magaz. t. 180. *Antheræ apice perforatæ in hac ſpecie, ac in præcedenti.*

* AZALEA (*piloſa*) foliis piloſis, ad apices niveis; floribus octandris; corollis ovatis. *A. piloſa. Michaux.*

Explicatio iconum.

Tab. 110. f. 1. AZALEA *procumbens.* (*a*) Flos integer. (*b*) Calyx. (*c*) Corolla. (*d*) Stamina. (*f*, *g*) Capſula. (*h*) Eadem diſſecta. (*i*) Eadem valvulis apertis. *Fig. ex Mill.*

Tab. 110. f. 2. AZALEA *glauca.* (*a*, *b*) Summitas ramuli cum floribus. (*c*) Corolla aperta. (*d*) Calyx. (*e*) Stamina, piſtillum. (*f*) Staminum inſertio. (*g*) Antheræ ampliatæ. (*h*, *i*) Capſula integra & diſſecta. (*l*) Gemma. (*m*, *n*) Flos junior. (*o*) Folium ſeparatum.

314. EPACRIS.

Charact. eſſent.

COR. infundibuliformis, villoſa. Squamulæ 5, ad baſim germinis. Capſ. 5-locularis.

Charact. nat.

Cal. quinquepartitus, æqualis, perſiſtens: foliolis lanceolatis.

Cor. monopetala, infundibuliformis, calyce longior. Tubus ſenſim ampliatus in limbum quinquefidum: laciniis ovato-acutis, ſupra villoſis.

Stam. Filamenta quinque, breviſſimà, tubo corollæ inſerta. Antheræ ovatæ, incumbentes.

Piſt. Germen ſuperum, ſubrotundum, quinque-ſtriatum; ſquamulis quinque obovatis, emarginatis, baſi cinctum; ſtylus cylindricus, brevis. Stigma capitatum.

Peric. Capſula globoſo-depreſſa, quinquelocularis, quinquevalvis.

Sem. numeroſa, minima.

Tableau des espèces.

A fruit capsulaire.

* EPACRIS (*à longues feuilles*) arboré, à feuilles linéaires-lancéolées, engainées à leur base; grappes droites, articulées, latérales. *La Nouvelle-Zélande.*

* EPACRIS (*feuilles de romarin*) frutiqueux, à feuilles linéaires, obtuses, roides, engainées; fleurs solitaires, latérales. *La Nouvelle-Zélande.*

* EPACRIS (*nain*) herbacé? à feuilles ovales-oblongues, embriquées; fleurs sessiles, solitaires, terminales. *La Nouvelle-Zélande.*

A fruit en baie.

* EPACRIS (*juniperoïde*) arboré; à feuilles éparses, linéaires, aiguës, dentelées; fleurs sessiles, solitaires, terminales. *La Nouvelle-Zélande.*

* EPACRIS (*fasciculé*) arboré, à feuilles ramassées, linéaires, acuminées; grappes en épi, latérales, penchées. *La Nouv-Zélande.*

Explication des fig.

Pl. III. f. 1. EPACRIS *nain.* (*a*) Jeune fleur encore fermée. (*b*, *c*) La même épanouie. (*d*) Corolle ouverte. (*e*, *f*) Pistil. (*g*) Ecaille de l'ovaire. (*h*) Capsule coupée en travers.

Pl. III. f. 2. EPACRIS *à feuilles longues.* (*a*) Corolle entière. (*b*) Découp. de cette cor. avec une étamine. (*c*) Pistil. (*d*) Ecaille du pistil. (*e*) Fleur de l'ép. junipé roide.

315. MÈSE.

Caract. essent.

CAL. double. Cor. campanulée, 5-fide. Baie semi-inférieure, 1-loculaire, polysperme.

Caract. nat.

Cal. double. L'*extérieur* plus petit, diphylle, à folioles ovales; concaves. L'*intérieur* monophylle, campanulé, adhérent à l'ovaire,

Conspectus specierum.

Fructu capsulari.

* EPACRIS (*longifolia*) arborea, foliis linear-lanceolatis, basi vaginantibus; racemis erectis, articulatis, lateralibus. *Forst. an Epacris frondosa. Gærtn. t. 94.*

* EPACRIS (*rosmarinifolia*) fruticosa, foliis linearibus, obtusis, rigidis, vaginantibus; floribus solitariis, lateralibus. *Forst.*

* EPACRIS (*pumila*) herbacea? foliis ovato-oblongis, imbricatis; floribus sessilibus, solitariis terminalibus. *Forst.*

Fructu baccato.

* EPACRIS (*juniperina*). arborea, foliis sparsis, linearibus, cuspidatis, serrulatis; floribus sessilibus, solitariis, terminalibus. *Forst.*

* EPACRIS (*fasciculata*) arborea, foliis confertis linearibus, acuminatis; racemis spicatis, lateralibus cernuis. *Forst. Ardisia acerosa? Gærtn. t. 94.*

Explicatio iconum.

Tab. III. f. 1. EPACRIS *pumila.* (*a*) Flos nondum apertus. (*b*, *c*) Idem expansus. (*d*) Corolla aperta. (*e*, *f*) Pistillum. (*g*) Squamula germinis. (*h*) Capsula transversim secta. *Fig. ex Forst.*

Tab. III. f. 2. EPACRIS *longifolia.* (*a*) Corolla integra. (*b*) Ejusdem lacinia, cum stamine. (*c*) Pistillum. (*d*) Squamula pistilli. (*e*) Flos ep. juniperinæ. *Fig. ex Forst.*

315. BÆOBOTRIS.

Caract. essent.

CAL. duplex. Cor. campanulata, 5-fida. Bacca semi infera, 1-locularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. duplex: *exterior* minor, diphyllus; foliolis ovatis, concavis. *Interior* monophyllus, campanulatus, germini adnatus, quinquefidus;

quinquefide : à découpures ovales, perſiſtantes, conniventes, après la floraiſon.

Cor. monopétale, campanulée. Limbe quinquefide, droit : à découp. ovales, obtuſes, très-courtes.

Etam. Cinq filamens, très-courts, attachés au milieu du tube. Anthères en cœur.

Piſt. Ovaire ſemi-inférieur, globuleux. Style cylindrique, très-court, perſiſtant. Stigmate obtus, tuberculeux.

Péric. Baie globuleuſe, inférieure, couronnéee par le calice, uniloculaire.

Sem. Pluſieurs, anguleuſes, attachées à un placenta central.

Tableau des eſpèces.

2260. MÈSE *lancéolé*. Dict.
M. à feuilles lancéolées, dentées.
L. n. l'Arabie. ♄ *Arbre. Feuilles alt. Grappes paniculées, axillaires. Fl. blanches.*

* MÈSE (*des bois*). à feuilles ovales, dentées. *De l'iſle Tanna.*

Explication des fig.

Pl. III. MÈSE *des bois* (*a*) Fleur de grandeur nat. (*b*) La même groſſie. (*c*) Calice. (*d*) Corolle. (*e*) La même coupée, montrant les étamines. (*f*) Calice coupé, montrant l'ovaire. (*g*) Piſtil groſſi. (*h*) Baie de grandeur naturelle. (*i*) La même coupée. (*k*) Sem.

laciniis ovatis, perſiſtentibus, poſt antheſin conniventibus.

Cor. monopetala, campanulata. Limbus quinquefidus, erectus : laciniis ovatis, obtuſis, breviſſimis.

Stam. Filamenta quinque, breviſſima, medio tubi inſerta. Antheræ cordatæ.

Piſt. Germen ſemi-inferum, globoſum. Stylus cylindricus, breviſſimus, perſiſtens. Stigma obtuſum, tuberculatum.

Peric. Bacca globoſa, infera, calyce coronata, unilocularis.

Sem. Plura, anguloſa, receptaculo centrali affixa.

Conſpectus ſpecierum.

2260. BÆOBOTRYS *lanceolata.*
B. foliis lanceolatis, ſerratis. *Vahl.*
Ex Arabia. ♄ *Mæſa. Forsk. Ægypt. p. 66.*
B. lanceolata. Vahl. ſymb. 1. p. 19. t. 6.

* BÆOBOTRYS (*nemoralis*) foliis ovatis, dentatis. *Forſt. Gen. t. 11. Vahl. ſymb. p. 19.*

Explicatio iconum.

Tab. III. BÆOBOTRYS *nemoralis.* (*a*) Flos magnitudine nat. (*b*) Idem ampliatus. (*c*) Calyx. (*d*) Cor. (*e*) Eadem diſſecta, ſtamina exhibens. (*f*) Calyx diſſectus, germen oſtendens. (*g*) Piſtillum auctum. (*h*) Bacca magn. nat. (*i*) Eadem diſſecta (*k*) Sem. *Fig. ex Forſt.*

FIN du Tome premier.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*

151.



Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Dodonæa.



Elaphrium.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Fossier Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*

Euphoria.



Melicocca.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Sapindus. *Savonier.*

P. J. Redouté Del. *Benard Direxit.*

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

P.J. Redouté Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

P. J. Redouté Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Hagenia. *Cusso*.

Fossier Del. *Benard Direxit.*

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Stadmania.

Schmidelia.

Fossier Del. Benard Direx.

Weinmannia.

Poiret Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Galenia.

Moerhingia.



Codia. *Codie.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit

Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Coccoloba. *Raisinier.*



J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Toulicia.

Cardiospermum.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*

Paullinia. *Paullinie.*

Fossier Del. Benard Direxit.

Cercodea.

Paris.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Adoxa. *Moscatelle.*

Polyfcias.

Elatine.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

J. F. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Cassuvium. *Acajou.*

P.J. Redouté Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*

Palovea. *Paloué*



Cassytha.



J. E. de Seve Del. Bénard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Rheum, *Rhubarbe.*

Butomus.



J. E. de Seve Del.

Benard Direxit

Sophora.

Fossier Del.

Benard Direxit

J. E. de Seve Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

P.J. Redouté Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Anagyris.

Cercis. *Gainier.*

Fossier Del. *Benard Direxit.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Hymenœa.

Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Cassia. *Casse.*



J.E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Poinciana.

P.J. Redouté Del. Benard Direxit.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Fossier Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Parkinsonia.

Guilandina.



Poiſſier Del. Benard Direxit.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Tachigalia.

Touchiroa.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit

Hœmatoxylon.

Prosopis.



J. E. de Seve Del.

Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

270.

Fossier Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Copaifera.



Guaiacum.

Bessier Del.

Benard Direxit.

J. F. de Seve Del.

Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Fossier Del. Benard Direxit.

Ruta. *Rue.*

Zygophyllum.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Fagonia.



Tribulus.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Trigonia, *Trigonier.*

Fossier Del. *Benard Direxit*

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Potalia. *Potalie.*

Fossier Del. *Benard Direxit.*

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Sandoricum.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

176.

Bessier Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Cookia.

Heisteria.

Poscier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Aquilaria.

Garo.



Bucida.

J. E. de Seve Del. *Benard Dir. ext.*

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Quiſqualis.

Calycopteris.



Lossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Ekebergia. *Ekeberg.*

Fossier Del. *Benard Direxit.*

Cacoucia. *Cacoucier.*

P. J. Redouté Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Guiera. *Guier.*

Mouriria.

P. J. Redouté Del.

Benard Direxit.

Melastoma.

J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

Monotropa.

Dionaea.

Inocarpus.



J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*

Rhododendrum.

Rhodora.

J. E. de Seve Del.

Benard Direxit

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Arbutus. *Arbousier.*

J.E. de Seve Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Dais.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Clethra.

Styrax.



Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Fossier Del.

Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

P. J. Redouté Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Saxifraga.

P. J. Redouté Del.

Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Scleranthus. *Gnavelle.*

Chrysosplenium. *Dorine.*

Fossier Del. *Benard Direxit*

Trianthema.



Gypsophila.



J. E. de Sève Del.

Benard Direxit.

Saponaria. *Saponaire.*

Diathus. *Oeillet.*

Fossier Del. *Benard Direxit.*

Cucubalus.

Silene.

Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Stellaria.

Arenaria. *Sabline.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Garidella.



Cherleria.

Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Deutzia.

Hortensia.

Fossier Del.

Benard Direxit.

Malpighia.

Banisteria.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Erythroxylon.

J. E. de Seve Del

Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Fossier Del.

Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Tapiria.

Fossier Del. Benard Direxit.

P.J. Redouté Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Forskolea.

Grielum.

Poiret Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE *Botanique*.



Bossier Del.

Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Sedum.



Penthorum.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Oxalis.

Lychnis.



J. E. de Seve Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE *Botanique*.

Cerastium.

Spergula.

J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

Neurada.

Phytolacca.



Vossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Possier Del. Benard Direxit.

Crateva.



Boscia.

J. E. de Seve Del. Benard Direxit.

Rhizophora, *Paletuvier.*

Fossier Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Bruguiera.



Vatica.

J. E. de Sève Del. Benard Direxit.

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique*.

Bassia. *Illipé.*

Tessier Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE, *Botanique.*

Winterana.



Aristotelia.

J. F. de Seve Del. Benard Direxit

HISTOIRE NATURELLE *Botanique*.

Triumfetta.



Bartramia.



J. E. de Seve Del.

Benard Direxit.

39088006379044